Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Mifepristone

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Korlym; Mifeprex

Advertencia

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Rara vez puede haber infecciones graves, hemorragia u otros problemas luego de cualquier tipo de aborto. Esto incluye cuando se usa este medicamento para terminar el embarazo. A veces, estos problemas pueden ser mortales.
- Asegúrese de saber a quién debe llamar y qué debe hacer en caso de emergencia. Esto incluye ir a una sala de emergencias si no puede ubicar a su médico. Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre que no desaparece, dolor abdominal muy fuerte, frecuencia cardíaca acelerada, gran cantidad de sangrado vaginal que no desaparece o desmayos.
- Si este medicamento no produce un aborto completo, es posible que se necesite un procedimiento quirúrgico para ello. Asegúrese de que entiende la información referente a este medicamento, su finalidad, modo de usarla y cuándo acudir al proveedor de salud médica. Usted debe autorizar el aborto y la cirugía, en caso de ser necesarios. Debe leer la guía del medicamento y firmar el formulario de acuerdo del paciente.

- Si usted tiene que acudir a una sala de emergencia o a otro proveedor de salud médica, lleve consigo la guía del medicamento.
- Si este medicamento no surte efecto en 2 días, su médico puede recetarle otro medicamento. Llame a su médico de inmediato si siente dolor estomacal, debilidad, malestar estomacal o vómitos o diarrea durante más de 24 horas después de tomar el otro medicamento.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Su utilización durante el embarazo provocará la pérdida del feto.
- No lo tome si está embarazada. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada. Utilice un tipo de anticonceptivo que no sea a base de hormonas mientras tome este medicamento y durante 1 mes después de terminar el tratamiento. Hable con su médico.
- Si se suspende este medicamento durante más de 14 días, debe realizar otra prueba de embarazo. Hable con su médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para terminar un embarazo.
- Se utiliza para reducir el nivel de azúcar en la sangre en pacientes con síndrome de Cushing.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: insuficiencia suprarrenal, problemas de hemorragias o porfiria.

- Si tiene un embarazo que no se encuentra dentro del útero (embarazo ectópico).
- Si tiene colocado el dispositivo intrauterino.
- Si no puede seguir las indicaciones que le brinda su médico para terminar su embarazo o si no puede ir a un centro de emergencia médica en caso de que lo necesite.
- Si está embarazada de más de 10 semanas.
- Si no puede entender o seguir las indicaciones del acuerdo entre el paciente y el proveedor de salud médica.
- Si tiene un crecimiento en el ovario, trompa de Falopio o alrededor de estas zonas.
- Si está tomando un anticoagulante o toma un esteroide de acción prolongada, como la prednisona.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: cambio en las células que recubren el útero, cáncer de endometrio o si alguna vez tuvo sangrado vaginal sin causa conocida.
- Si no padece de síndrome de Cushing.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: Enfermedad hepática o niveles bajos de potasio.
- Si está tomando un anticoagulante o toma un esteroide de acción prolongada, como la prednisona.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se usan para el colesterol alto, infecciones, migrañas, problemas de estado de ánimo, entre otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Puede quedar embarazada de nuevo luego de que termine su embarazo. Si no quiere volver a embarazarse, comience a utilizar un método anticonceptivo en el que confíe para evitar el embarazo tan pronto como concluya el embarazo o antes de volver a tener relaciones sexuales.
- Es normal tener una hemorragia o manchado vaginal por 9 a 16 días luego de usar este medicamento. A veces, esto ha durado hasta 30 días. Llame a su médico de inmediato si la hemorragia vaginal continúa, si hay hemorragia vaginal abundante que no desaparece o si le preocupa la hemorragia vaginal.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y

dentistas.

- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Evite la toronja (pomelo) y el jugo de toronja.
- Las píldoras anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia para prevenir el embarazo. Utilice algún método anticonceptivo adicional, como un condón, mientras toma este medicamento y durante 1 mes después de la última dosis.
- Si queda embarazada mientras toma este medicamento o en 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Hemorragia fuerte (cuando se humedecen 2 toallitas por hora).

- Dolor estomacal grave.
- Diarrea intensa.
- Grave irritación vaginal.
- Dolor pélvico.
- Latido cardíaco acelerado.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Síntomas de una glándula suprarrenal débil, como náuseas o vómitos muy fuertes, mareos fuertes o desmayos, debilidad muscular, sensación de cansancio, cambios de humor, disminución del apetito o pérdida de peso.
- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Ansiedad.
- Dolor o presión en el pecho.
- Falta de aire.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Problemas para dormir.
- Puede producirse un nivel bajo de azúcar en sangre. El riesgo puede ser mayor si toma este medicamento junto con algunos medicamentos para la diabetes. Los signos pueden ser mareos, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, temblores, ritmo cardíaco acelerado, confusión, hambre o sudoración. Llame al médico de inmediato si tiene cualquiera de estos

signos. Siga las instrucciones que le han dado si presenta una baja de azúcar en la sangre. Esto incluye tomar tabletas de glucosa, glucosa líquida o algunos jugos de frutas.

- Este medicamento puede generar un tipo de ritmo cardiaco que no es normal (intervalo QT prolongado). Comuníquese con su médico de inmediato si tiene una frecuencia cardíaca acelerada, una frecuencia cardíaca que no es normal o desmayos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Dolor estomacal o diarrea.
- Náusea o vómito.
- Cólicos abdominales.
- Flujo vaginal.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Boca seca.
- Ardor de estómago.
- Dolor de espalda, muscular o articular.

- Irritación en la nariz o garganta.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Deberá tomar este medicamento con otro medicamento llamado misoprostol para terminar el embarazo. Asegúrese de saber cuándo y cómo tomar misoprostol luego de tomar este medicamento. Si tiene preguntas, hable con el médico o farmacéutico.
- La mayoría de las personas terminarán el embarazo en un período de 2 a 24 horas luego de tomar misoprostol. Durante este período, tendrá hemorragia y cólicos que probablemente serán más fuertes de lo normal. Asegúrese de tomar el misoprostol en un lugar adecuado para estar preparada. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.
- Acuda a evaluación médica tal como le indicaron.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Se debe tomar con alimentos.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro

proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Si se usa para poner fin a un embarazo:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Si se usa para el azúcar elevada de la sangre:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta

información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2025-02-04

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Mifepristone - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center