Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Miglustat

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

**Nombres comerciales: EE. UU.**
Opfolda; Yargesa; Zavesca

**Nombres comerciales: Canadá**
Opfolda; SANDOZ Miglustat; Zavesca

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la enfermedad de Gaucher.
- Se utiliza con otro medicamento (cipaglucosidasa alfa) para tratar la enfermedad de Pompe.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente

de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene enfermedad renal.
- Si está o podría estar embarazada. Algunas marcas comerciales de este medicamento no deben utilizarse durante el embarazo.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos,

enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede causar diarrea. Si presenta diarrea, consulte con médico sobre cómo disminuir este efecto. No deje de tomar este medicamento sin antes consultar con el médico.
- Este medicamento ha causado problemas de fertilidad en animales. Los problemas de fertilidad pueden afectar la incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre.

## Productos utilizados para tratar la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick tipo C:

- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Siga el plan de alimentación según las recomendaciones de su médico.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma

durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

## Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:

- Este medicamento se toma junto con otro llamado cipaglucosidasa alfa. Asegúrese de conocer las advertencias, beneficios y riesgos. Si tiene preguntas o inquietudes, consulte al médico.
- Este medicamento puede causar daño al feto. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.
- Si puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 60 días después de la última dosis. Si queda embarazada, llame al médico de inmediato.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar

relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

### Productos utilizados para tratar la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick tipo C:

- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Debilidad.
- Cambio en la vista.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Dificultad para caminar.

### Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:

- Fiebre.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Todas las presentaciones:

- Mareos o dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Ardor de estómago.
- Hinchazón de estómago.

### Productos utilizados para tratar la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick tipo C:

- Pérdida de peso.
- Gases.
- Boca seca.
- Dolor de espalda.
- Calambres en las piernas.
- Calambres musculares.
- Sensación de pesadez en brazos o piernas.

- Cambios en el período (menstrual).
- La agitación o los temblores son frecuentes con este medicamento. A veces, esto puede desaparecer en 1 a 3 meses. Llame al médico de inmediato si tiene temblores en las manos o temblores nuevos o que empeoran.

**Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:**

- Se siente cansado o débil.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

**¿Cómo se toma mejor este medicamento?**
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

**Productos utilizados para tratar la enfermedad de Gaucher**

**o de Niemann-Pick tipo C:**

- Es mejor administrar este medicamento entre las comidas o según las indicaciones de su médico.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

**Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:**

- Este medicamento se toma cada dos semanas como se le ha indicado. Tómelo aproximadamente 1 hora antes de su dosis de cipaglucosidasa alfa, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Trague la cápsula entera con agua. También puede ingerirlo con una bebida no azucarada, como té o café, sin crema, azúcar ni edulcorantes.
- No ingiera alimentos ni bebidas (excepto bebidas sin azúcar) durante al menos 2 horas antes y 2 horas después de tomar este medicamento.

**¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

**Productos utilizados para tratar la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick tipo C:**

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

**Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:**

- No empiece a tomar su dosis de cipaglucosidasa alfa. Llame a su proveedor de atención médica para reprogramar.

**¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**
**Todas las presentaciones:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

**Productos usados con cipaglucosidasa alfa para tratar la enfermedad de Pompe:**

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la

información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

## Última fecha de revisión

2025-07-29


## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.


Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.


Miglustat - Last updated on December 12, 2022


Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center