Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Mycophenolate

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
CellCept; CellCept Intravenous; Myfortic; Myhibbin

Nombres comerciales: Canadá
ACH-Mycophenolate; APO-Mycophenolate; APO-Mycophenolic Acid; CellCept; CellCept IV; JAMP-Mycophenolate; JAMP-Mycophenolic Acid; MAR-Mycophenolate Mofetil; MAR-Mycophenolic Acid; Myfortic; SANDOZ Mycophenolate Mofetil; TEVA-Mycophenolate

Advertencia

- El uso de este medicamento durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la muerte del bebé nonato. Deberá hacerse una prueba de embarazo justo antes de empezar a tomar este medicamento y otra vez luego de 8 a 10 días para

demostrar que NO está embarazada. Además, tendrá que hacerse pruebas de embarazo de rutina durante el tratamiento. Consulte al médico.

- Si puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo para evitar el embarazo mientras toma este medicamento y por 6 semanas después de la última dosis. Los métodos anticonceptivos a base de hormonas, como las pastillas anticonceptivas, pueden perder su eficacia para prevenir el embarazo. Si utiliza métodos anticonceptivos a base de hormonas, también tendrá que usar un método anticonceptivo adicional. El médico le hablará sobre los métodos anticonceptivos que está utilizando. Si queda embarazada o cree que está embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, como el linfoma o cáncer de piel. Llame al médico de inmediato si presenta un cambio en el color o tamaño de un lunar, un crecimiento o bulto en la piel, una gran pérdida de peso, sudores nocturnos o glándulas inflamadas.
- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Algunas infecciones fueron graves o mortales. Lávese las manos con frecuencia.

Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.

- Llame al médico de inmediato si observa signos de infección tales como fiebre, escalofríos, signos de gripe, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, llagas en la boca o una herida que no cicatriza.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para evitar que el organismo dañe al órgano después de un trasplante de órgano.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene el síndrome de Lesch-Nyhan o Kelley-Seegmiller o una deficiencia heredada rara de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa, (HGP).

- Si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: azatioprina, colestiramina, colesevelam, colestipol, norfloxacina con metronidazol o sevelámero.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si puede quedar embarazada y no usa 2 tipos de métodos anticonceptivos.
- Si está amamantando o planea hacerlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que

requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.

- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si es diabético, vigile cuidadosamente el nivel de azúcar en la sangre.
- Consulte con el médico antes de aplicarse vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Las probabilidades de desarrollar cáncer de piel podrían incrementarse. Evite el sol, las lámparas solares y las camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos del sol.
- Se pueden realizar análisis de hepatitis B o C. Una infección por hepatitis B o C puede empeorar mientras tome este medicamento.
- Este medicamento ha causado hemorragia, orificios y úlceras en el tracto gastrointestinal (GI). En ocasiones las personas tuvieron que hospitalizarse. Consulte con el médico.

- Este medicamento puede causar diarrea. Si presenta diarrea, consulte con médico sobre cómo disminuir este efecto. No deje de tomar este medicamento sin antes consultar con el médico.
- Si tiene fenilcetonuria (PKU), hable con el médico. Algunos productos contienen fenilalanina.
- Es posible que deba evitar donar sangre mientras tome este medicamento y durante un tiempo después. Consulte con su médico.
- Es posible que deba evitar donar esperma mientras tome este medicamento y durante un tiempo después. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.
- Se han producido reacciones alérgicas con productos de micofenolato. La mayoría de las veces, esto ocurrió desde unas pocas horas y hasta el día siguiente al inicio del tratamiento. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Si su pareja sexual puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por lo menos 90 días después de su última dosis. Si su pareja queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o

vómitos.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Mareos o desmayos.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Calambres musculares.
- Inflamación.
- Piel pálida.
- Manchas blancas en la boca.
- Picazón o flujo vaginal.

- Piel u ojos amarillentos.
- La aplicación de este medicamento ha causado un problema de salud llamado síndrome inflamatorio agudo (AIS). En ocasiones, las personas han tenido que ir al hospital. La mayoría de las veces, los signos aparecieron semanas o meses después de comenzar a tomar este medicamento o después de un aumento de la dosis. Llame al médico de inmediato si tiene fiebre, dolor o entumecimiento articular, o dolor muscular.
- Este medicamento causó un problema cerebral grave llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). Puede provocar discapacidad o puede ser mortal. Informe a su médico de inmediato si tiene síntomas como confusión, problemas de memoria, depresión, cambios en su comportamiento, cambios en la fuerza de 1 lado del cuerpo que es mayor que la del otro lado, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la vista.
- Algunas personas tratadas con este medicamento han tenido problemas renales muy graves causados por una infección viral específica (virus BK). En personas con trasplante de riñón, la infección por virus BK puede causar la pérdida del riñón. Llame a su médico de inmediato si tiene síntomas de enfermedad renal como cambio en la cantidad de orina, dificultad o dolor al

orinar o sangre en la orina.

- Algunas personas presentaron problemas de pulmón al tomar este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame a su médico de inmediato si presenta signos de problemas en los pulmones, como falta de aire u otro problema para respirar, aparición o agravamiento de la tos o fiebre.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Dolor de espalda.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor de cabeza.
- Gases.
- Se siente cansado o débil.
- Temblores.
- Problemas para dormir.

Inyección:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Tome con el estómago vacío al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas a menos que su médico le indique lo contrario.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Si está tomando un antiácido que contenga aluminio o magnesio, consúmalo al menos 2 horas después de tomar este medicamento.

Todos los productos de tabletas:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.

Cápsulas:

- Se debe tragar entera. No se debe masticar, abrir ni triturar.
- Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.
- Si la cápsula está abierta o rota, no toque el contenido. Si los contenidos se tocan o entran en los ojos, lávese las manos o los ojos de inmediato.

Todos los productos de suspensión:

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el

medidor que viene con el medicamento.

- No lo mezcle con ningún otro medicamento líquido.
- Use guantes al preparar y administrar una dosis.
- Si entra en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Si este medicamento entra en sus ojos, enjuague con agua fría.
- Si se derrama este medicamento, límpielo con toallas de papel húmedas. Limpie el exterior del frasco después de haber puesto el tapón.
- Este medicamento puede administrarse a través de ciertos tamaños de sondas de alimentación. Algunos tamaños de sondas de alimentación no deben usarse para administrar este medicamento. Utilice este medicamento según se le ha indicado. Enjuague la sonda de alimentación luego de administrar este medicamento. Si no está seguro de si lo puede usar con una sonda de alimentación, hable con el médico.

Inyección:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Tabletas de liberación retardada:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Todos los demás productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si faltan menos de 2 horas para la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Polvo para suspensión:

- Conservar a temperatura ambiente o en el refrigerador después de mezclar la suspensión. No lo congele.
- Deseche la porción que no utilice al cabo de 60 días de haber mezclado este medicamento. Pregúntele al farmacéutico si no está seguro de cuándo fue.

Líquido (suspensión):

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Todos los demás productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información

sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-08-28

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.

Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Mycophenolate - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center