Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Nalmefene

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Opvee; Zurnai

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para contrarrestar los efectos de algunos medicamentos.
- Este medicamento se utiliza para tratar ciertas sobredosis.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de

esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si toma medicamentos como metadona o buprenorfina para ayudar a dejar de tomar un medicamento opioide.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si tiene un trastorno por consumo de opioides y le administran este medicamento, es posible que tenga signos de abstinencia de opioides. Algunos de estos signos son sudoración, temblores, fiebre, escalofríos, diarrea, malestar estomacal, vómitos, calambres estomacales, piel erizada, dolores corporales, ansiedad,

sensación de irritabilidad, bostezos o latidos rápidos.

- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la

visión.

- Falta de aire.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.

Autoinyectores:

- Si está más sensible al dolor.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Náusea o vómito.

Autoinyectores:

- Zumbido en los oídos.
- Malestar de oídos.
- Sensación de calor o frío.
- Acaloramiento.

- Mareos o dolor de cabeza.
- Sensación de irritabilidad.

Pulverizador nasal:

- Nariz tapada.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Disminución del apetito.
- Boca seca.
- Ojos secos.
- Estreñimiento.
- Mareos o dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Se siente cansado o débil.
- Ansiedad.
- Sofocos o bochornos.
- Sudoración.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección (I.V.):

- Este medicamento se administra por inyección intravenosa.

Todas las demás presentaciones:

- Asegúrese de conocer los signos de una sobredosis y cuándo utilizar este medicamento. Si no está segura, consulte al médico.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Llame al 911 o busque atención médica de emergencia

inmediatamente después de la primera dosis de este medicamento.

- Después de administrarse este medicamento, los síntomas de sobredosis podrían desaparecer y regresar. Es importante recibir ayuda médica de inmediato después de administrarse este medicamento.
- Cada dispositivo tiene 1 sola dosis y no se puede volver a utilizar. Si necesita otra dosis, deberá usar un dispositivo nuevo.
- No retire este medicamento del envase hasta que esté listo para usarlo. No prepare ni pruebe el medicamento antes de utilizarlo.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.

Pulverizador nasal:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para la nariz. No lo acerque a la boca ni a los ojos (puede quemar).

Autoinyectores:

- Este medicamento se administra como una inyección en un músculo o bajo la piel.
- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede

administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.

- Revise este medicamento a través de la mirilla cada 30 días. El líquido debe ser de transparente e incoloro a amarillo claro. No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está túrbida o tiene partículas. Obtenga uno nuevo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Inyección (I.V.):

- Este medicamento se administrará cuando sea necesario en un centro de atención médica.

Spray nasal y autoinyectores:

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Pulverizador nasal:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- No congelar.
- Proteja del calor y de la luz.

Autoinyectores:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.

- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Proteja del calor.

Inyección (I.V.):

- Este medicamento se administrará en un establecimiento de salud. No almacenará este medicamento en su casa.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende

ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2024-08-20

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Nalmefene - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center