



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Naloxone

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

FT Naloxone HCl [OTC]; Kloxxado; Narcan [DSC]; Narcan [OTC]; Rextovy; Rezenopy; RiVive [OTC]; Zimhi [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Narcan; S.O.S. Naloxone Hydrochloride; TEVA Naloxone

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para prevenir los efectos secundarios de ciertos medicamentos.
- Este medicamento se utiliza para tratar ciertas sobredosis.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que

tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si tiene un trastorno por consumo de opioides y le administran este medicamento, es posible que tenga signos de abstinencia de opioides. Algunos de estos signos son sudoración, temblores, fiebre, escalofríos, diarrea, malestar estomacal, vómitos, calambres estomacales, piel erizada, dolores corporales, ansiedad, sensación de irritabilidad, bostezos o latidos rápidos.
- En los bebés menores de 4 semanas de vida que han estado recibiendo medicamentos opioides en forma regular, la interrupción repentina del medicamento puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo tiene convulsiones, llora más de lo normal o tiene más reflejos.
- Consulte al médico sobre qué formas de este medicamento son las más adecuadas para los niños.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.
- Si este medicamento se utiliza durante el embarazo, puede causar signos de abstinencia en el nonato. El nonato deberá ser controlado por un médico una vez que se empieza a usar este medicamento.

Productos inyectables distintos a los autoinyectores y las jeringas

precargadas:

- Han ocurrido efectos secundarios muy graves cuando se administró este medicamento después de una cirugía. Esto incluye presión arterial baja o alta, latidos anormales y ciertos problemas pulmonares o cardíacos. En ocasiones, estos efectos secundarios originaron problemas cerebrales, estado de coma o la muerte. Consulte al médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Convulsiones.
- Falta de aire.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Cambios de humor.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente

efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Pulverizador nasal:

- Dolor muscular.
- Espasmo muscular.
- Dolor de cabeza.
- Nariz seca.
- Goteo o congestión nasal.
- Hinchazón de la nariz.
- Estreñimiento.
- Dolor dental.
- Piel seca.
- Dolor de estómago.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Mareos.
- Se siente cansado o débil.
- Algunas personas pueden presentar signos como sudoración, temblores, malestar estomacal o sensación de enojo al despertar después de recibir este medicamento. Esto es normal.

Todos los productos inyectables:

- Náusea o vómito.
- Mareos.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Sofocos o bochornos.
- Acaloramiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Aerosol nasal, inyección mediante autoinyector y jeringas precargadas :

- Asegúrese de conocer los signos de una sobredosis y cuándo utilizar este medicamento. Si no está segura, consulte al médico.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Después de administrarse este medicamento, los síntomas de sobredosis podrían desaparecer y regresar. Es importante recibir ayuda médica de inmediato después de administrarse este medicamento.
- Cada dispositivo tiene 1 sola dosis y no se puede volver a utilizar. Si necesita otra dosis, deberá usar un dispositivo nuevo.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Use solo 1 aerosol para una dosis.
- Si se administra más de 1 dosis, cambie de orificio nasal en cada dosis.
- No retire este medicamento de la bolsa o blíster hasta que esté listo para usarlo. No prepare ni pruebe el aerosol antes de utilizarlo.
- Si este medicamento se congela, algunas marcas pueden descongelarse a temperatura ambiente antes de usarse. Si ocurre una emergencia y este medicamento está congelado, no espere a que se descongele. Obtenga ayuda médica inmediatamente.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Este medicamento se administra en forma de inyección en el músculo o en la capa de grasa de la piel.
- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está turbida o tiene partículas. Use una nueva.

Todos los demás productos inyectables:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Pulverizador nasal:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- No almacenar a más de 40 °C (104 °F).

- No congelar.
- Proteja del calor y de la luz.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Guárdelo en el envase que le proporcionaron para protegerlo de la luz.

Todos los demás productos inyectables:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro

proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-02-23

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Naloxone - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).