



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Octreotide

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Bynfezia Pen; Mycapssa; SandoSTATIN; SandoSTATIN LAR Depot

### **Nombres comerciales: Canadá**

Octreotide Acetate Omega; SandoSTATIN; SandoSTATIN LAR

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la diarrea y el acaloramiento producidos por el cáncer.
- Este medicamento se utiliza para tratar la acromegalia.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

### **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está o va a ser tratado con un medicamento llamado lutecio Lu 177 dotatate.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.

- Algunos pacientes podrían presentar hipoglucemia o hiperglucemia después de recibir este medicamento. Consulte con el médico.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- En personas que tienen problemas de fertilidad por acromegalia, este medicamento puede mejorar la fertilidad. Esto puede provocar un embarazo. Si desea evitar el embarazo mientras toma este medicamento, use un método anticonceptivo.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### **Cápsulas:**

- Los productos anticonceptivos a base de hormonas que contienen levonorgestrel podrían no actuar correctamente para evitar un embarazo. Use algún otro tipo de método anticonceptivo, como un condón, si usa un método anticonceptivo que contenga levonorgestrel. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.

## **Jeringas o plumas precargadas:**

- No comparta plumas o dispositivos con cartucho con otras personas incluso si se ha cambiado la aguja. Es posible contagiar infecciones de una persona a otra al compartir estos dispositivos. Esto incluye infecciones que usted podría desconocer que tiene.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de niveles tiroideos bajos como estreñimiento, problemas para manejar el frío, problemas de memoria,

cambios de estado de ánimo o una sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo que no es normal.

- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Síntomas de altos o bajos niveles de azúcar en la sangre, tales como aliento con olor a fruta, respiración acelerada, ritmo cardíaco acelerado, confusión, somnolencia, debilidad, enrojecimiento de la piel, migrañas, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, temblores o sudor.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Mareos o desmayos graves.
- Inflamación.
- Heces blandas, pálidas, aceitosas y con mal olor; hinchazón de estómago; y pérdida de peso.

- Se han producido problemas de la vesícula biliar al tomar este medicamento. En ocasiones, algunas personas tuvieron que tratarse en el hospital. En algunos casos, hubo que extirpar la vesícula biliar. Se produjo una muerte. Llame al médico inmediatamente si presenta signos como dolor en la zona superior derecha del vientre, en la zona del hombro derecho o entre los omóplatos; piel u ojos amarillos; fiebre con escalofríos; distensión abdominal; o mucho malestar estomacal o vómitos.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

#### **Todas las presentaciones:**

- Gases.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal, o vómitos.

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Pérdida del pelo.
- Dolor de espalda, muscular o articular.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Signos de un resfrío común.

### **Cápsulas:**

- Sudoración excesiva.

### **Todos los productos inyectables:**

- Dolor, hinchazón, enrojecimiento o hematomas en el lugar donde se administró la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su

médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Cápsulas:**

- Tome este medicamento en ayunas. Tómelo al menos 1 hora antes o 2 horas después de cada comida.
- Se debe tragar entera. No se debe masticar, abrir ni triturar.
- Tome este medicamento con un vaso de agua.
- Presione suavemente en el borde del blíster para extraer una cápsula. No utilice los dos pulgares para sacarla del blíster ni presione el centro de la cápsula. Si rompe o agrieta una cápsula, tírela.

### **Todos los productos de inyección de acción corta:**

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.

- Antes de la inyección, permita que alcance la temperatura ambiente. No caliente este medicamento.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- No administre en la piel que esté en un radio de 2 pulgadas (5 cm) de la última inyección.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

### **Jeringas o plumas precargadas:**

- Retire todas las cubiertas de las agujas de los cartuchos antes de inyectar una dosis (puede haber 2). Consulte al médico si no está seguro del tipo de aguja que debe usar con el cartucho.
- Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
- No transfiera este medicamento de la pluma a una

jeringa.

### **Viales:**

- Un médico o un proveedor de atención médica pueden aplicarlo por vía intravenosa.

### **Inyección de acción prolongada:**

- Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

#### **Cápsulas y todos los productos de inyección de acción corta:**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Inyección de acción prolongada:**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

#### **Cápsulas:**

- Conserve los recipientes sin abrir en el refrigerador. No congelar.

- Luego de la primera administración, conserve a temperatura ambiente. Deseche lo que no consumió luego de 30 días.

### **Jeringas o plumas precargadas:**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Proteja de la luz.
- No utilice el producto si se congeló.
- Después del primer uso, puede conservar a temperatura ambiente hasta por 28 días. Deseche lo que no se utilizó luego de 28 días.
- Quite la aguja después de cada inyección. No almacene este dispositivo si está colocada la aguja.

### **Inyección de acción rápida (viales y jeringas precargadas):**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Puede conservar los contenedores sin abrir a temperatura ambiente. Si los almacena a temperatura ambiente, deseche la parte no utilizada después de 2 semanas.
- Algunos productos pueden usarse más de una vez. Si su producto se puede usar más de una vez, asegúrese de saber cuánto tiempo puede almacenarlo antes de tener

que tirarlo.

## **Inyección de acción prolongada:**

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

## **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de

atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2024-11-11

## **Derechos de autor**

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Octreotide - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center