



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ofatumumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Arzerra [DSC]; Kesimpta

Nombres comerciales: Canadá

Kesimpta

Advertencia

- Si tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, este medicamento puede hacer que el virus se vuelva activo. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales. Se le realizarán pruebas de hepatitis B antes de comenzar el tratamiento con este medicamento. Tendrá que estar alerta de los signos de hepatitis mientras toma este medicamento y por varios meses luego de dejar de tomarlo. Consulte con su médico.
- Este medicamento causó un problema cerebral grave llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). Puede provocar discapacidad o puede ser mortal. Informe a su médico de inmediato si tiene síntomas como confusión, problemas de memoria, depresión, cambios en su comportamiento, cambios en la fuerza de 1 lado del cuerpo que es mayor que la del otro lado, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la vista.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Inyección (subcutánea):

- Este medicamento se utiliza para tratar la esclerosis múltiple.

Infusión intravenosa:

- Este medicamento se utiliza para tratar un tipo específico de leucemia.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene una infección.
- Si tiene una infección de hepatitis B activa.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Algunas

infecciones fueron graves o mortales. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.

- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Hable con el médico si recientemente se le ha colocado una vacuna o antes de que le coloquen alguna. El uso de vacunas con este medicamento puede aumentar la posibilidad de infección o bien hacer que la vacuna no funcione correctamente.
- Es posible que tenga que esperar algún tiempo tras interrumpir este medicamento antes de ponerse ciertas vacunas.
- Si puede quedar embarazada, consulte con el médico. Es posible que deba utilizar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algo más de tiempo luego de su última dosis.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.
- Si consumió este medicamento cuando estaba embarazada, infórmelo a su obstetra.

Infusión intravenosa:

- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Se han producido efectos secundarios graves durante y dentro de las 24 horas posteriores a la administración de este medicamento. La mayoría de las veces, se produjeron después de la primera dosis, pero también se observaron después de dosis posteriores. Algunos de estos efectos pueden poner en peligro la vida o ser mortales. Informe a su médico de inmediato si usted tiene una erupción cutánea; urticaria; picazón; latidos cardíacos rápidos, lentos o anormales; dolor de espalda o muscular; dolor de pecho o presión; fiebre o escalofríos; enrojecimiento; dificultad para respirar; dolor de estómago o malestar; mareos intensos; desmayos; sensación de mucho cansancio o debilidad, o dolor de cabeza severo.

Infusión intravenosa:

- Se siente muy cansado o débil.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Los pacientes con cáncer que toman este medicamento pueden tener un mayor riesgo de padecer un problema de salud grave llamado síndrome de lisis tumoral (SLT). Esto puede producir la muerte. Llame al médico de inmediato si presenta latidos cardíacos rápidos o anormales, desmayos,

problemas al orinar, debilidad muscular o calambres, malestar estomacal, vómitos, diarrea o si no puede comer o se siente decaído.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Se siente cansado o débil.
- Signos de un resfrío común.

Inyección (subcutánea):

- Picazón, enrojecimiento, hinchazón u otra reacción en el lugar donde se administró la inyección.
- Fiebre leve.
- Dolor de cabeza.

Infusión intravenosa:

- Náuseas.
- Diarrea.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección (subcutánea):

- Este medicamento se administra por inyección en la parte grasa de la piel, en la parte superior del muslo, en la zona abdominal o en la parte superior de brazo.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- No agitar.
- Permita que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Déjelo a temperatura ambiente durante 15 a 30 minutos. No caliente este medicamento.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- No lo aplique en un lunar.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No lo utilice si la solución no es clara, está ligeramente turbia, o tiene fugas o partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Cada pluma y jeringa precargada sirve para un único uso. Deseche cualquier la pluma o jeringa que haya usado luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Jeringas o plumas precargadas:

- No retire la tapa hasta que esté listo para usarlo. No intente volver a colocar la tapa. Úselo dentro de los 5 minutos después de haber quitado la tapa.
- Si se le cae la pluma, no la use si está dañada o si se le cayó sin la tapa.

Jeringas precargadas:

- No retire la tapa ni la cubierta hasta que esté listo para administrarlo.
- Este medicamento tiene un protector de aguja que la cubrirá una vez que se haya realizado la inyección. No toque las aletas de la jeringa antes de su uso. Si lo hace, es posible que el protector cubra la aguja demasiado pronto.

Infusión intravenosa:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.
- Se pueden administrar otros medicamentos para atenuar los efectos secundarios de la infusión.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Inyección (subcutánea):

- Si olvida tomar una dosis de este medicamento durante las primeras 3 semanas de tratamiento, llame al médico para saber qué debe hacer.
- Si olvida tomar una dosis de este medicamento después de las primeras 3 semanas de tratamiento, tome la dosis omitida y comience un nuevo calendario según el momento en que se administre la dosis.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Infusión intravenosa:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Inyección (subcutánea):

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si fuera necesario, este medicamento puede almacenarse a temperatura ambiente hasta 7 días. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 7 días, deseche el medicamento.
- Este medicamento puede devolverse al frigorífico después de haber estado almacenado a temperatura ambiente. Debe utilizarse en los próximos 7 días. Si este medicamento no se utiliza en los 7 días siguientes a su devolución al frigorífico, deséchelo.

Infusión intravenosa:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-08-26

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ofatumumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center