Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Olanzapine and Fluoxetine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Symbyax [DSC]

Advertencia

- Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas o acciones suicidas en niños y adultos menores. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estos pensamientos o reacciones en el pasado. Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vigilancia cuidadosa. Llame al médico de inmediato si hay signos de depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico o cambios de humor o reacciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene algún pensamiento o reacción suicida.
- Este medicamento no es apto para ser utilizado en niños menores de 10 años de edad. Consulte a su médico.
- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. También se ha producido un mayor número de accidentes cerebrovasculares, algunos de los cuales han sido mortales. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la depresión.
- Se utiliza para tratar el trastorno bipolar.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: linezolida, azul de metileno, pimozida o tioridazina.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si está tomando medicamentos que pueden causar un cierto tipo de frecuencia cardíaca que no es normal (intervalo QT prolongado). Existen muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregúntele al médico o al farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Se observaron niveles altos de azúcar en sangre o diabetes, colesterol alto y aumento de peso con medicamentos similares a este. Estos pueden aumentar el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos del cerebro.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin consultar al médico. Puede tener un mayor riesgo de presentar efectos secundarios. Si debe dejar de tomar el medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique su médico.
- Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este medicamento. Esto puede provocar caídas, lo que puede causar fracturas de huesos u otros problemas de salud.
- Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.
- Consulte con el médico antes de consumir marihuana, otras formas de cannabis o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Tenga cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física. Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.

- Este medicamento puede aumentar el riesgo de hemorragias. A veces, las hemorragias pueden ser letales. Consulte al médico.
- Si tiene un trastorno bipolar, pueden producirse episodios maníacos mientras toma este medicamento. Llame a su médico si tiene signos de un episodio maníaco.
- Este medicamento puede ocasionar niveles bajos de sodio. Los niveles de sodio muy bajos pueden ser letales, provocar convulsiones, desmayos, problemas para respirar, o muerte.
- Se han presentado problemas sexuales con medicamentos como este. Esto incluye un menor interés sexual, problemas para tener un orgasmo, problemas de eyaculación o problemas para lograr o mantener una erección. Si tiene preguntas, consulte con el médico.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Esto puede afectar la capacidad para quedar embarazada. Este efecto se revierte al suspender el medicamento. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Informe al médico si está embarazada, si es posible que lo esté o si planea quedar embarazada mientras toma este medicamento. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé. Tomar este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede aumentar el riesgo de hemorragia después del parto y puede causar algunos problemas de salud en el recién nacido.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de niveles bajos de sodio como dolores de cabeza, problemas para concentrarse, problemas de memoria, confusión, debilidad, convulsiones o cambios en el equilibrio.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Falta de aire.
- Inflamación.
- Aumento de tamaño de los pechos, secreción del pezón, incapacidad de conseguir o mantener una erección, cambios en el período menstrual.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.
- Problemas para orinar.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Erección dolorosa (pene rígido) o erección que dura más de 4 horas.
- Algunas personas pueden tener mayores probabilidades de padecer problemas en los ojos con este medicamento. Es posible que el médico quiera realizarle un examen de los ojos para ver si usted tiene una mayor probabilidad de padecer estos problemas. Llame al médico de inmediato si tiene dolor en el ojo, cambios en la vista o hinchazón o enrojecimiento en o

alrededor del ojo.

- Puede provocar un problema grave, y a veces mortal, denominado síndrome de serotonina. El riesgo puede ser mayor si también toma otros medicamentos determinados. Llame a su médico de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos, o dolor de cabeza muy intenso.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre, calambres o endurecimiento en los músculos, mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, frecuencia cardíaca acelerada, latidos anormales o sudoración excesiva.
- Se ha producido una reacción severa y a veces mortal. La mayoría de las veces, esta reacción tiene signos como fiebre, picazón o ganglios inflamados con problemas en los órganos corporales como el hígado, los riñones, la sangre, el corazón, los músculos y las articulaciones o los pulmones. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
- Algunas personas pueden tener un problema muscular grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Llame a su médico de inmediato si tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o problemas con la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- Se observó un tipo de latido cardíaco anormal (intervalo QT prolongado) con la administración de este medicamento. A veces, esto ha provocado otro tipo de latido cardíaco anormal peligroso (torsades de pointes). Comuníquese con su médico de inmediato si tiene una frecuencia cardíaca

acelerada, una frecuencia cardíaca que no es normal o desmayos.

- Se han presentado recuentos bajos de glóbulos blancos con el uso de este medicamento. Esto puede generar mayor riesgo de infección. En pocas ocasiones, las infecciones han sido mortales. Dígale al médico si alguna vez tuvo recuento bajo de glóbulos blancos. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de infección, como fiebre, escalofríos o dolor de garganta.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Boca seca.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Aumento del apetito.
- Aumento de peso.
- Temblores.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento por la noche.

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo

cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2025-04-02

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Olanzapine and Fluoxetine - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center