



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Palovarotene

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Sohonos

Nombres comerciales: Canadá

Sohonos

Advertencia

- No tome este medicamento si está embarazada. El uso durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la pérdida del feto.
- Se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada antes de comenzar el uso del medicamento y mientras lo tome.
- Es común presentar irritación cutánea con este medicamento. Esto incluye piel seca; labios secos, escamosos o agrietados; pérdida de cabello; picazón; enrojecimiento de la piel; sarpullido; descamación de la piel; y eccema. Esto también puede aumentar el riesgo de infecciones cutáneas. Pregunte al médico o al farmacéutico cómo prevenir o tratar la irritación cutánea. Llame a su médico si alguno de estos efectos es severo, le molesta o no desaparece.
- Si queda embarazada mientras toma este medicamento o en 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.
- Este medicamento puede provocar cambios en el crecimiento de los huesos. Esto puede causar que los niños dejen de crecer. Se debe hacer controles de crecimiento periódicos a los niños mientras toman este medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para disminuir el crecimiento del hueso donde normalmente no crece en personas con fibrodisplasia osificante progresiva (FOP).

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si usa otro medicamento como este. Si no está seguro, pregúntele al médico o al farmacéutico.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, infecciones, convulsiones y otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si puede quedar embarazada y no usa métodos anticonceptivos.
- Si está amamantando. No amamante mientras esté tomando este medicamento y hasta 1 mes después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Es posible que tenga una visión nocturna reducida. Puede ser repentino. Puede mejorar después de dejar de tomar el medicamento pero a veces no sucede.
- Tenga cuidado cuando maneje de noche o realice otras tareas con luz

escasa.

- Este medicamento puede causar debilidad o adelgazamiento en los huesos. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir una fractura ósea.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico. Esto incluye radiografías de la médula espinal.
- Asegúrese de que las cápsulas no entren en contacto con una mujer embarazada o capaz de quedar embarazada.
- Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos.
- Es frecuente tener ojos secos con este medicamento. Se pueden usar lágrimas artificiales, geles lubricantes para los ojos u otros productos para prevenir o tratar los ojos secos. Si tiene preguntas, hable con el médico o el farmacéutico.
- Evite la toronja (pomelo) y el jugo de toronja.
- Evite otras fuentes de vitamina A.
- No done sangre mientras toma este medicamento y durante 1 semana luego de suspenderlo.

Niños:

- Este medicamento puede no ser apto para utilizar en niños de todas las edades. Consulte con el médico antes de administrar este medicamento a un niño.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Comportamiento nuevo o peor, o cambios de humor, como depresión o pensamientos suicidas.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambios en la uñas.
- Dolor de huesos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Ojos secos.
- Boca seca.
- Náuseas.
- Dolor de espalda, muscular o articular.
- Dolor de cabeza.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Se siente cansado o débil.
- Es común presentar irritación cutánea con este medicamento. Esto incluye piel seca; labios secos, escamosos o agrietados; pérdida de cabello; picazón; enrojecimiento de la piel; sarpullido; descamación de la piel; y

eccema. Esto también puede aumentar el riesgo de infecciones cutáneas. Pregunte al médico o al farmacéutico cómo prevenir o tratar la irritación cutánea. Llame a su médico si alguno de estos efectos es severo, le molesta o no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con alimentos.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Trague entera. No muerda o triture.
- Es común presentar irritación cutánea con este medicamento. Esto incluye piel seca; labios secos, escamosos o agrietados; pérdida de cabello; picazón; enrojecimiento de la piel; sarpullido; descamación de la piel; y eccema. Esto también puede aumentar el riesgo de infecciones cutáneas. Pregunte al médico o al farmacéutico cómo prevenir o tratar la irritación cutánea. Llame a su médico si alguno de estos efectos es severo, le molesta o no desaparece.
- Si alguien más le está dando este medicamento, asegúrese de que esa persona use guantes para evitar el contacto con este medicamento.
- Si abre la cápsula, utilice toallas de papel y un envase que pueda cerrarse (como una bolsa con cierre) para recoger y tirar los residuos.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si han transcurrido más de 6 horas desde la dosis faltante, omítala y continúe con su horario habitual.
- No tome 2 dosis el mismo día.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-04-07

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Palovarotene - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center