



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Pegvaliase

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Palynziq

### **Nombres comerciales: Canadá**

Palynziq

### **Advertencia**

- Se han producido reacciones alérgicas durante el tratamiento con este medicamento. En algunos casos, han puesto en riesgo la vida. Esto puede suceder en cualquier momento pero ocurre con más frecuencia 1 hora después de recibir este medicamento. Un proveedor de atención médica lo observará de cerca durante al menos 60 minutos después de su primera dosis. Si es necesario, un proveedor de atención médica lo puede observar de

cerca también durante las otras dosis.

- Obtenga ayuda médica inmediatamente si tiene cualquier dolor de pecho; mareos o desmayos; frecuencia cardíaca rápida; sofocos; incapacidad para controlar la orina o heces; sarpullido, picazón, abultamientos en la piel, inflamación del rostro, labios, ojos, lengua; opresión en el pecho o garganta; problemas para respirar o sibilancia; molestias estomacales fuertes, vómitos o diarrea o cualquier otro efecto negativo.
- Su médico le administrará otro medicamento (epinefrina) para utilizar en caso de una reacción alérgica. Manténgalo consigo en todo momento mientras tome este medicamento. Asegúrese de saber cómo y cuándo usarlo. Busque ayuda médica de inmediato después de utilizar epinefrina.
- El médico puede indicarle que busque la presencia de un adulto en caso de que se produzca una reacción alérgica. Si esto es necesario, asegúrese de que esa persona lo observe de cerca cuando tome la dosis y durante al menos 60 minutos después de la dosis. Asegúrese de que sepa dónde se almacena la epinefrina y cómo administrarla si es necesario.
- El médico le enseñará cómo tomar este medicamento. Asegúrese de saber cuánto debe

tomar, con qué frecuencia y cómo debe almacenar este medicamento. Si el médico no le informa cómo usar este medicamento o si no está seguro de cómo hacerlo, consulte al médico.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la fenilketonuria (PKU).

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Lleve la tarjeta de seguridad del paciente con usted en todo momento.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Siga el plan de alimentación según las recomendaciones de su médico.
- Las reacciones cutáneas que se extienden sobre la piel son comunes con este medicamento y han durado al menos 14 días. Estas reacciones han incluido picazón, sarpullido y enrojecimiento. Las reacciones cutáneas también pueden ser un signo de una reacción alérgica. Hable con su médico sobre las reacciones cutáneas sobre las que debe llamar de inmediato.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- Si queda embarazada mientras toma este medicamento

o en 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.

- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Se han presentado infecciones en el lugar en el que se administró este medicamento. A veces, estas infecciones fueron graves. Algunas necesitaron tratamiento en el hospital, incluida una cirugía. Llame al

médico de inmediato si tiene ampollas, escaras, heridas abiertas o signos de infección en el lugar donde se administró este medicamento, como enrojecimiento que no desaparece, supuración, calor, hinchazón o sensibilidad.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor en las articulaciones.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor en la boca.
- Dolor de garganta.
- Tos.
- Se siente cansado o débil.
- Ansiedad.
- Pérdida del pelo.

- Nariz tapada.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Se administra por inyección en la parte grasa de la piel de la parte superior del brazo, muslo, glúteos o el área del estómago.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.

- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo. Deje reposar este medicamento a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. No caliente este medicamento.
- No aplicar en un lunar, cicatriz, marca de nacimiento o sarpullido. No aplique sobre la piel enrojecida, tatuada, irritada, quemada, sensible, magullada, dura o dañada.
- No lo administre en una zona infectada de la piel.
- No agitar.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Cambie el lugar donde pone la inyección cada vez.
- Si su dosis es mayor a 1 inyección, puede aplicarlas en la misma parte del cuerpo. Sin embargo, aplique las inyecciones al menos a 5 cm (2 pulgadas) de distancia entre ellas.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene

preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

- Se pueden administrar otros medicamentos junto con este para evitar los efectos secundarios.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si es necesario, puede almacenarlo a temperatura ambiente.
- Si se almacena a temperatura ambiente, deseche los medicamentos que no se utilizaron luego de 30 días o luego de la fecha de vencimiento, lo que ocurra primero.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan

expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué

cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad

relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2026-01-09

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pegvaliase - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center