

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Phenytoin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Dilantin; Dilantin Infatabs; Dilantin-125; Phenytek; Phenytoin Infatabs

Nombres comerciales: Canadá

Dilantin; Dilantin Infatabs; Dilantin-125; Dilantin-30; TARO-Phenytoin; Tremytoine

Advertencia Inyección:

 Este medicamento puede causar una frecuencia cardíaca anormal o presión arterial baja si se lo administra muy rápido. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Su médico controlará detenidamente el corazón cuando se le administre este medicamento. Avísele a su médico de inmediato si tiene una frecuencia cardíaca acelerada, lenta o anormal durante una dosis o después de una.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

• Este medicamento se utiliza para ayudar a controlar ciertos tipos de convulsiones.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar

este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando delavirdina.
- Si ha tenido problemas en el hígado anteriormente mientras tomó este medicamento.
- Si tiene un ritmo cardíaco lento, obstrucción en el corazón u otro ritmo cardiaco anormal.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Este medicamento interactúa con muchos otros medicamentos. Pueden aumentar los efectos secundarios graves, potencialmente mortales o mortales. Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Se han producido reacciones cutáneas graves con la administración de este medicamento. Estos han incluido el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), la necrólisis epidérmica tóxica (NET) y otras reacciones cutáneas graves. En algunos casos, estos problemas han sido mortales. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación en la piel; otro tipo de irritación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas

en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

- Las personas con cierto gen (HLA-B*1502) tienen una mayor probabilidad de presentar reacciones cutáneas graves y, a veces, mortales con este medicamento. Este gen es más común en personas de ascendencia asiática, incluidas las personas indias del sur de Asia. La probabilidad también puede ser mayor en personas con un tipo de gen llamado CYP2C9*3. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
- Al igual que otros medicamentos que pueden administrarse para tratar las convulsiones, este medicamento rara vez aumenta el riesgo de tener pensamientos o acciones suicidas. Es posible que exista un mayor riesgo en personas que tuvieron pensamientos o acciones suicidas en el pasado. Llame al médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que haya empeorado, como depresión, nerviosismo, inquietud, mal humor, ataques de pánico u otros cambios en el estado de ánimo o conducta. Llame al médico de inmediato si se presentan pensamientos o acciones suicidas.
- Se han producido problemas en los ganglios linfáticos como cáncer en personas que tomaban este medicamento. Se desconoce si este medicamento podría ser la causa. Hable con su médico si tiene glándulas inflamadas.
- Este medicamento ha provocado problemas cardíacos, como un ritmo cardíaco lento. Llame a su médico de inmediato si presenta signos de problemas cardíacos como mareos o desmayo, dolor o presión en el pecho, cansancio o latidos cardíacos anormales.
- Este medicamento puede causar debilidad en los huesos. Esto puede suceder más a menudo si se utiliza durante un período largo. Esto puede aumentar el riesgo de fracturas. Llame al médico de inmediato si tiene dolor de huesos.
- Si es diabético, vigile cuidadosamente el azúcar en la sangre. Informe a su médico si tiene síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden dejar de prevenir el embarazo. Utilice también otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Un problema de hemorragia que puede poner en riesgo la vida puede ocurrir en recién nacidos si consume este medicamento durante el embarazo.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Dificultad para caminar.
- Confusión.

- Farfulla.
- Encías inflamadas o doloridas.
- Dolor fuerte en los músculos.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibro, problemas para tragar o hablar.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Temblores.
- Se ha producido un efecto grave y, en ocasiones, mortal, en personas que tomaban medicamentos para convulsiones como este. Llame a su médico de inmediato si presenta glándulas inflamadas, fiebre, sarpullido, heridas dolorosas en la boca o cerca de los ojos, dolor de pecho, signos de problemas renales, como no poder orinar o cambios en la cantidad de orina, o signos de problemas hepáticos, como orina de color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos o piel u ojos amarillentos.
- Es poco frecuente que este medicamento cause problemas sanguíneos. Esto puede provocar problemas de hemorragia o infecciones. En ocasiones, estos problemas han sido mortales. Comuníquese con el médico de inmediato si observa signos de infección, como fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy fuerte, dolor sinusal o de oídos, tos, aumento del esputo o cambio en su coloración, dolor al orinar, llagas en la boca o una herida que no cicatriza. Comuníquese con el médico de inmediato si presenta hematomas o hemorragias inexplicables, piel pálida o si se siente muy cansado o débil.

Inyección:

- Cambio del color de la piel a negro o morado.
- Este medicamento puede causar daño en los tejidos si se filtra medicamento de la vena. Informe a la enfermera si tiene enrojecimiento, ardor, dolor, inflamación, ampollas, llagas en la piel o pérdida de líquido

en el sitio donde se colocó el medicamento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos o somnolencia.
- Dolor de cabeza.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Problemas para dormir.
- Estreñimiento.
- Náusea o vómito.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

• Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.

- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No tome antiácidos al mismo tiempo que toma este medicamento.
 Pregúntele al médico si tiene alguna pregunta sobre cómo tomar antiácidos con este medicamento.
- Si este medicamento se administra mediante una sonda de alimentación, suspenda la alimentación por sonda 2 horas antes de administrar este medicamento. Reanude la alimentación por sonda 2 horas después de la administración.

Tabletas de liberación extendida:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si el producto cambia de color, no lo utilice.

Tabletas masticables:

• Mastique o trague la tableta completa.

Suspensión:

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- No utilice cucharas soperas o cafeteras comunes para medir este medicamento. Si lo hace podría administrar una dosis demasiado alta.

Inyección:

• Este medicamento se administra constantemente en una vena durante cierto periodo.

Todas las presentaciones:

• Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este

medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Use una identificación de alerta médica de la enfermedad.
- Si sufre de convulsiones, respete las leyes correspondientes para conducir un vehículo.
- Cuide sus dientes. Visite regularmente al dentista.
- Si las convulsiones son diferentes o empeoran después de comenzar a tomar este medicamento, consulte con el médico.
- No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin consultar al médico. Podría tener un mayor riesgo de padecer convulsiones. Si debe suspender el medicamento, hágalo paulatinamente siguiendo las indicaciones del médico.
- Controle su nivel de fenitoína en la sangre según le haya indicado el médico. Si el nivel es muy elevado, pueden producirse ciertos efectos secundarios. Esto incluye un tipo de problema cerebral que posiblemente no pueda revertirse. Consulte con su médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis? Todos los productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Inyección:

• Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento? Todos los productos orales:

• Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Suspensión:

• No congelar.

Inyección:

 Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen.
 Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su

médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinicaleffectiveness-terms.

Última fecha de revisión

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Phenytoin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center