



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Rilpivirine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Edurant; Edurant PED

### **Nombres comerciales: Canadá**

Edurant

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la infección del VIH.
- Este medicamento se toma en combinación con otros medicamentos. Asegúrese de conocer las advertencias, beneficios y riesgos de los otros medicamentos. Consulte al médico si tiene preguntas o dudas acerca de cualquiera de los medicamentos.

### **Tabletas para suspensión:**

- Esta forma de este medicamento no está aprobada para utilizarse en adultos. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si debe tomar esta forma de este medicamento, debe pedirle al médico información sobre los riesgos y beneficios. Consulte con el médico si tiene preguntas sobre cómo tomar este medicamento.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si toma cualquiera de los siguientes medicamentos: carbamazepina, delavirdina, dexametasona, dexlansoprazol, efavirenz, esomeprazol, etravirina, lansoprazol, nevirapina, omeprazol, oxcarbazepina, pantoprazol, fenobarbital, fenitoína, rabeprazol, rifampina, rifapentina o hierba de San Juan.
- Si está embarazada, podría quedar embarazada o está amamantando. Antes de tomar este medicamento, tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé. También tendrá que hablar sobre la mejor manera de prevenir la transmisión del VIH al bebé.

## Niños:

- Si el paciente es un niño menor de 2 años. No le administre este medicamento a un niño menor de 2 años.
- Si su hijo/a pesa menos de 55 libras (25 kilogramos).

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Este medicamento ha provocado casos de colesterol alto. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de

laboratorio según le haya indicado el médico.

- Las distintas presentaciones de este medicamento no pueden intercambiarse entre sí. No cambie de presentación sin consultar al médico.
- Este medicamento no cura el VIH. Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien. Asegúrese de seguir bajo el cuidado de su médico y de acudir a sus citas con regularidad.
- Este medicamento ayuda a reducir la cantidad de VIH en la sangre. Reducir la cantidad de VIH en la sangre hasta que no se detecte en los análisis de sangre puede ayudar a disminuir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas. También hay otras formas de ayudar a prevenir el contagio del VIH a otras personas. Esto incluye el uso de preservativos durante las relaciones sexuales y no compartir agujas ni otro material de inyección. Hable con su médico u otro profesional de atención médica sobre la mejor manera de prevenir el contagio del VIH a otras personas.
- No tome una dosis mayor de la que el médico le indicó que tome. Tomar más de lo indicado puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios graves.

- Ciertos medicamentos o productos a base de hierbas pueden hacer que este medicamento no actúe correctamente. Asegúrese de informarles a su médico y a su farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de depresión, pensamientos suicidas, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.

- Pulso que no se siente normal.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Se siente muy cansado o débil.
- Pueden ocurrir cambios en su sistema inmunitario cuando comienza a tomar medicamentos para tratar el VIH. Si tiene una infección que no sabía que tenía, esta podría aparecer cuando tome este medicamento. Informe al médico de inmediato si presenta algún signo nuevo después de comenzar a tomar este medicamento, incluso después de tomarlo durante varios meses. Esto incluye signos de infección como fiebre, dolor de garganta, debilidad, tos o falta de aliento.
- Se han producido reacciones cutáneas y alérgicas graves con este medicamento. Las reacciones cutáneas se presentaron conjuntamente con la fiebre o con problemas en algunos órganos, como el hígado. Llame al médico de inmediato si tiene piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada (con o sin fiebre); ojos rojos o irritados; aftas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos; fiebre, dificultad para tragar o signos de problemas en el hígado, como orina oscura, cansancio, disminución del apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u ojos amarillentos.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Mareos o somnolencia.
- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

## ¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Tome este medicamento con una de las comidas.
- No consuma una bebida con proteínas o un yogur solos en lugar de una comida.
- Es importante que no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.
- No tome antiácidos por un período de 2 horas antes de este medicamento y 4 horas después del mismo.
- No tome cimetidina, famotidina, nizatidina, o ranitidina 12 horas antes o 4 horas después de tomar este medicamento.
- Si toma este medicamento con los comprimidos de cabotegravir, tómelos aproximadamente a la misma hora todos los días con una comida.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible, con una de las comidas.
- Si pasaron más de 12 horas desde la dosis faltante, omita

la dosis faltante y continúe con el horario normal.

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni

tome el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que

pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2024-03-29

## **Derechos de autor**

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.

Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Rilpivirine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center