



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Risankizumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Skyrizi; Skyrizi (150 MG Dose) [DSC]; Skyrizi Pen

Nombres comerciales: Canadá

Skyrizi

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis en placas.
- Este medicamento se utiliza para tratar la artritis psoriática.
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad de Crohn.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene una infección.
- Si tiene tuberculosis (TB).
- Si recientemente le administraron una vacuna viva.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.
- Antes de comenzar a tomar este medicamento deberá hacerse un análisis de tuberculosis.
- Asegúrese de estar al día con todas las vacunas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento.
- Consulte con el médico antes de recibir cualquier vacuna, antes de comenzar a tomar este medicamento, mientras lo toma y después de dejar de tomarlo. El uso de vacunas con este medicamento puede aumentar la posibilidad de infección o bien hacer que la vacuna no funcione correctamente.
- Si puede quedar embarazada, consulte con el médico. Es posible que deba utilizar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algo más de tiempo luego de su última dosis.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene

intención de embarazarse o está amamantando.

Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

- Si consumió este medicamento cuando estaba embarazada, infórmelo a su obstetra.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos

paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Mareos o desmayos graves.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Falta de aire.
- Toser sangre.
- Pérdida de peso.
- Piel dolorosa, caliente o rojiza; o llagas en el cuerpo.
- Dolores musculares.
- Orina con más frecuencia.
- Diarrea intensa.
- Dolor estomacal grave.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque

asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Signos de un resfrío común.
- Se siente cansado o débil.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor de cabeza.
- Dolor en las articulaciones.
- Dolor de espalda.
- Dolor de estómago.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos subcutáneos (para uso doméstico):

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Saque este medicamento del refrigerador y deje que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Asegúrese de saber cuánto tiempo dejarlo a temperatura ambiente. No lo caliente ni lo coloque en el microondas.
- Manténgase alejado de la luz solar directa.
- No agitar.
- No utilice este medicamento si se cayó o se está dañado.
- Este producto es transparente, pero puede contener algunas partículas pequeñas blancas o transparentes. También puede que vea una o más burbujas de aire. No lo tome si la solución es turbia, si tiene fugas o si tiene partículas grandes.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de

color.

- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- No aplique sobre la piel afectada con psoriasis.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Jeringas o plumas precargadas (para uso doméstico):

- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- No retire la tapa ni la cubierta hasta que esté listo para administrarlo.
- No inyecte a través de la ropa.

- Si su dosis es más de 1 inyección, aplíquelas en 2 lugares distintos.

On-Body inyector corporal:

- Utilice este medicamento en los 5 minutos posteriores a colocar el cartucho en el inyector corporal. No pulse el botón de inicio hasta que el inyector corporal esté listo para usar y colocado sobre la piel. Este botón solo se puede apretar 1 vez.
- No lo aplique en un lunar.
- No lo coloque sobre piel que tenga mucho vello.
- No utilice este producto en una zona de la piel que se pliegue o sobresalga.
- No moje este producto.
- Puede tomar hasta 5 minutos completar la inyección. Limite la actividad física mientras recibe este medicamento. Puede hacer cosas como caminar, estirarse y agacharse.
- Mantenga los dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, a una distancia de al menos 12 pulgadas (30 cm) de este producto hasta que finalice la inyección.

Viales:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Todos los productos subcutáneos:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

Viales:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos subcutáneos:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- No utilice el producto si se congeló.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.

Viales:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre

cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información

adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las

circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-04-19

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Risankizumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center