Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ritonavir

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Norvir

Nombres comerciales: Canadá

AURO-Ritonavir; Norvir

Advertencia

- Este medicamento interactúa con muchos otros medicamentos. Pueden aumentar las posibilidades de sufrir los efectos secundarios de este medicamento o disminuir su buen funcionamiento. También pueden aumentar las posibilidades de sufrir los efectos secundarios de los otros medicamentos. Esto puede incluir efectos secundarios graves, potencialmente mortales o mortales. Muchos medicamentos no se deben tomar con este. Consulte con su médico y el farmacéutico para confirmar que sea seguro tomar este medicamento con los otros medicamentos que usted toma (medicamentos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas).

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la infección del VIH.
- Este medicamento se toma en combinación con otros medicamentos.

Asegúrese de conocer las advertencias, beneficios y riesgos de los otros medicamentos. Consulte al médico si tiene preguntas o dudas acerca de cualquiera de los medicamentos.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si está embarazada, podría quedar embarazada o está amamantando. Es posible que deba evitar tomar algunas formas de este medicamento si está embarazada. Antes de tomar este medicamento, tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé. También tendrá que hablar sobre la mejor manera de prevenir la transmisión del VIH al bebé.

Líquido (solución):

- Si tiene una sonda de alimentación. Este medicamento no debe utilizarse con algunos tipos de sondas de alimentación.
- Si está tomando disulfiram.
- Si está tomando metronidazola

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o que empeora.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Este medicamento puede provocar niveles altos de colesterol y triglicéridos. Consulte al médico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento no cura el VIH. Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien. Asegúrese de seguir bajo el cuidado de su médico y de acudir a sus citas con regularidad.
- Este medicamento ayuda a reducir la cantidad de VIH en la sangre. Reducir la cantidad de VIH en la sangre hasta que no se detecte en los análisis de sangre puede ayudar a disminuir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas. También hay otras formas de ayudar a prevenir el contagio del VIH a otras personas. Esto incluye el uso de preservativos durante las relaciones sexuales y no compartir agujas ni otro material de inyección. Hable con su médico u otro profesional de atención médica sobre la mejor manera de prevenir el contagio del VIH a otras personas.
- Algunas personas con hemofilia han presentado una mayor hemorragia cuando tomaron medicamentos similares a este. Si tiene hemofilia, consulte a su médico.
- Se han presentado problemas hepáticos y de páncreas (pancreatitis) con este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden dejar de prevenir el embarazo. Utilice también otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.

Líquido (solución):

- Este medicamento contiene alcohol y propilenglicol. Estos pueden causar efectos secundarios muy graves y en ocasiones mortales en bebés recién nacidos o niños pequeños. No utilice este medicamento en recién nacidos prematuros o en recién nacidos de menos de 14 días, a menos que el médico lo indique.
- Si el paciente es un bebé de menos de 6 meses, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir efectos secundarios puede ser mayor en estos niños.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Diarrea intensa o duradera. Esto puede generar problemas con los líquidos y los electrolitos.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Mareos o desmayos.
- Acaloramiento.
- Sudoración excesiva.
- Inflamación.
- Visión borrosa.
- Modificación en la distribución de la grasa del organismo.
- Dolor de espalda, dolor abdominal, dolor en la ingle o sangre en la orina. Podrían ser síntomas de un cálculo renal.
- Pueden ocurrir cambios en su sistema inmunitario cuando comienza a tomar medicamentos para tratar el VIH. Si tiene una infección que no sabía que tenía, esta podría aparecer cuando tome este medicamento. Informe al médico de inmediato si presenta algún signo nuevo después de comenzar a tomar este medicamento, incluso después de tomarlo durante varios meses. Esto incluye signos de infección como fiebre, dolor de garganta, debilidad, tos o falta de aliento.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor estomacal o acidez estomacal.
- Gases.
- Se siente cansado o débil.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Entumecimiento u hormigueo en las manos, los pies o alrededor de la boca.
- Dolor de espalda, muscular o articular.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con la comidas.
- Es importante que no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.

Tabletas:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.

Líquido (solución):

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- Puede tomar el líquido solo o mezclarlo con un vaso lleno (8 onzas/240 mL) de leche chocolatada, Ensure® o Advera® para que tenga mejor sabor. Tome este medicamento antes de que pase 1 hora después de mezclarlo.

Envase con polvo:

- Asegúrese de saber cuánto paquetes debe utilizar.
- Mezcle el polvo con alimentos blandos, como puré de manzana o postre de vainilla. También puede mezclarlo con un líquido, como agua, leche chocolatada o fórmula para lactantes. Tome este medicamento dentro de un lapso de dos horas después de haber efectuado la mezcla. Deseche la porción que no utiliza después de mezclar.
- Tome este medicamento con alimentos para disminuir el sabor amargo.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Líquido (solución):

- Conserve la solución en su envase original a temperatura ambiente. Manténga la tapa bien cerrada. Deséchelo una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento.

Tabletas:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente. Mantenga la tapa bien cerrada. Si lo almacena fuera de su envase original, deseche la parte no consumida al cabo de 2 semanas. Este medicamento puede exponerse a temperaturas de entre 86 °F y 122 °F (30 °C y 50 °C) durante 7 días.

Envase con polvo:

- Conserve a temperatura ambiente.

Todas las presentaciones:

- Proteja del calor.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento

de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2026-08-03

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ritonavir - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center