



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Rivastigmine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Exelon

Nombres comerciales: Canadá

APO-Rivastigmine; Exelon; JAMP Rivastigmine; JAMP-Rivastigmine; MED-Rivastigmine; MYLAN-Rivastigmine; Rivastigmine Patch 10; Rivastigmine Patch 15; Rivastigmine Patch 5; SANDOZ Rivastigmine

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la demencia en personas que tienen la enfermedad de Alzheimer.
- Este medicamento se utiliza para tratar la demencia en personas que tienen la enfermedad de Parkinson.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tuvo una reacción cutánea a este medicamento u otra presentación de este medicamento anteriormente.
- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, esmolol, labetalol, metoclopramida, metoprolol, nadolol, nebivolol, pindolol, propranolol, sotalol o timolol.
- Si toma otros medicamentos llamados anticolinérgicos, como ipratropio o oxibutinina. Hable con su médico si no está seguro y desea saber si alguno de sus medicamento es un medicamento anticolinérgico.
- Si el paciente es un/a niño/a. No administre este medicamento a niños.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y

trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Con este medicamento es común tener diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o pérdida de peso. La diarrea crónica o el vómito pueden provocar deshidratación. Llame al médico si alguno de estos efectos secundarios es muy grave, le molesta o no desaparece. Llame al médico de inmediato si experimenta signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos; sed; latido acelerado; mareos; respiración acelerada o confusión.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el

bebé.

Parche cutáneo:

- Evite el uso de fuentes de calor (como lámparas solares, camas solares, almohadillas calientes, mantas eléctricas, lámparas de calor, saunas, jacuzzis, camas de agua caliente, etc.). Evite tomar largos baños calientes y exponerse al sol. Su temperatura podría aumentar y podría ingresar una gran cantidad de medicamento a su organismo.
- El parche puede contener metal conductivo. Quíteselo antes de la resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es nuevo o empeora.
- Temblor, dificultad para movilizarse, entumecimiento.
- Mareos severos o desmayos.
- Convulsiones.
- Confusión.
- Depresión.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Ritmo cardíaco lento.
- Problemas para orinar.

- Irritación cutánea.
- Caídas.

Parche cutáneo:

- Descamación, picazón, enrojecimiento, hinchazón, calor o piel sensible.
- Ampollas o llagas con supuración, secreciones o que forman costras.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Disminución del apetito.
- Pérdida de peso.
- Dolor estomacal o diarrea.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.

- Ansiedad.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Tome este medicamento con la comidas.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.
- Tómese solo o mezcle con agua, jugo o bebida gaseosa antes de beber.
- Si mezcla una dosis en agua, jugos de fruta fría o refrescos, puede conservar la dosis mezclada a temperatura ambiente hasta 4 horas antes de tomarla.

Parche cutáneo:

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso cutáneo.
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Aplique el parche sobre la piel limpia, seca y sana en la parte superior o inferior de la espalda. Si esto no es posible, aplíquelo sobre la parte superior del brazo o el pecho.
- Aplique el parche en una zona que no tenga vello.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones, polvo u otros

productos para la piel. Es posible que el parche no se adhiera correctamente.

- No aplique sobre la piel irritada o lastimada. No aplique sobre el área con pliegues de piel o donde la ropa ajustada vaya a rozar la piel.
- Cambie la ubicación del parche con cada parche. No aplique en la misma área por más de 14 días.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.
- Aplique el parche a aproximadamente la misma hora.
- No aplique más de 1 parche a la vez. Retire el parche viejo antes de colocar uno nuevo. Si lleva más de 1 parche a la vez, podría tener una sobredosis grave y, en ocasiones, mortal.
- Tenga cuidado de no aflojar el parche mientras se ducha o baña.
- Guarde la bolsa en la que vino el parche después de colocárselo. Luego de quitarse el parche, asegúrese de doblar los lados adhesivos entre sí. Coloque los parches usados en la bolsa que guardó. Deséchelos fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si este medicamento ingresa en los ojos, lave con agua de inmediato. Si tiene irritación en los ojos que perdura o cambios en la visión, llame a su médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Todos los productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible, con una de las comidas.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no toma el medicamento durante varios días, comuníquese con su médico antes de volver a tomarlo.

Parche cutáneo:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- No aplique doble dosis ni dosis adicionales.
- Si no toma el medicamento durante varios días, comuníquese con su médico antes de volver a tomarlo.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las

mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Solución oral:

- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.
- No congelar.

Parche cutáneo:

- Guarde los parches en la bolsa protectora hasta que se vayan a usar.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2021-07-28

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Rivastigmine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).