



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ropinirole

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: Canadá

JAMP-Ropinirole [DSC]; SPC-Ropinirole; TEVA-Ropinirole

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.
- Este medicamento se utiliza para tratar el síndrome de piernas inquietas.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- No deje de tomar este medicamento sin antes hablar con el médico. Si deja de tomar este medicamento, puede tener signos de abstinencia. Si debe dejar de tomar este medicamento, hágalo según la indicación del médico. Llame a su médico de inmediato si tiene alguno de estos signos al reducir la dosis o suspender este medicamento: fiebre, confusión, entumecimiento muscular grave, indiferencia por las cosas, ansiedad, depresión, sensación de cansancio, dificultad para dormir, sudoración o dolor.
- Si comienza o deja de fumar, consulte al médico. Es posible que la cantidad de medicamento que toma sea modificada.
- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el doctor le indique.
- El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es un problema de salud muy grave y en ocasiones mortal que se ha observado cuando se suspendió de forma repentina la administración de medicamentos como este. El SNM también ha ocurrido cuando se disminuyó la dosis. Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre, calambres o entumecimiento en los músculos, mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos cardíacos

anormales o rápidos o sudoración excesiva.

- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Síndrome de las piernas inquietas:

- Dígale a su médico si sus síntomas empeoran o aparecen durante el día.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Sentirse confundido, no poder concentrarse o cambiar de comportamiento.
- Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar (comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).
- Cambio en la vista.

- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Cambios de humor.
- Falta de aire.
- Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es nuevo o empeora.
- Inflamación.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Fiebre.
- Tensión muscular.
- Algunas personas se han quedado dormidas durante actividades como conducir, comer o hablar. Algunas personas no sentían sueño y se sentían alerta antes de dormirse. Esto ha sucedido hasta 1 año después de iniciar el tratamiento con este medicamento. Si se queda dormido durante algunas actividades, no conduzca ni realice otras tareas o acciones que requieran de su atención completa mientras toma este medicamento. Llame a su médico de inmediato si ha sucedido eso o si siente mucho sueño.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal, o vómitos.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Sudoración excesiva.

- Boca seca.
- Dolor en las articulaciones.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Temblores.
- Ansiedad.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor de espalda.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Si deja de tomar este medicamento, consulte al proveedor de salud médica. Es posible que deba volver a tomarlo comenzando con una dosis menor que se aumente gradualmente.

Tabletas:

- Si tiene el síndrome de piernas inquietas, tome el medicamento entre 1 y

3 horas antes de dormir.

Tabletas de liberación extendida:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si tiene un problema de salud, como diarrea, en el que el medicamento pasa muy rápidamente a través del cuerpo, es posible que vea algo que parezca una tableta en las heces. Consulte al médico si esto sucede.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si se salta el medicamento durante algunos días, llame al médico para averiguar cómo recomenzar a tomarlo.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2021-08-03

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ropinirole - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).