Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Scopolamine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Transderm Scop; Transderm-Scop [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

ACCEL-Hyoscine; Buscopan

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para aliviar el mareo por movimiento.
- Este medicamento se utiliza para tratar los espasmos gastrointestinales.
- Se utiliza para prevenir el malestar estomacal y el vómito causados por una intervención quirúrgica.
- Este medicamento se utiliza durante una cirugía.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: Dolor en el pecho, colon agrandado, glaucoma, pulso acelerado, insuficiencia cardíaca (corazón débil), miastenia grave, bloqueo o estrechamiento estomacal o intestinal, o problemas para orinar.
- Si tiene presión alta durante el embarazo (preeclampsia).

Tabletas:

- Si tiene problemas de salud hereditarios raros como mala absorción de glucosa-galactosa, intolerancia a la fructosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa.
- Si tiene intolerancia a la lactosa.

Inyección (si se aplica en el músculo):

- Si está tomando un adelgazante para la sangre.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este

medicamento.

- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.
- Consulte con el médico antes de consumir marihuana, otras formas de cannabis o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Si participará en deportes debajo del agua, consulte al médico. Este medicamento puede hacer que se sienta perdido o confundido.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con su médico para saber si posee un riesgo mayor de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.
- Las luces brillantes pueden provocar irritación. Use lentes para el sol.
- Tenga cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física. Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.
- No lo tome durante más tiempo del que le indicó su médico.
- Si ha estado tomando este medicamento de manera habitual y deja de tomarlo en forma repentina, es posible que tenga síntomas de abstinencia. No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin consultar al médico. Dígale a su médico si tiene algún efecto secundario.
- Este medicamento no está aprobado para su uso en niños. Los niños pueden tener un mayor riesgo de algunos efectos secundarios como problemas nerviosos, cambios mentales, problemas de visión y temperatura corporal elevada grave. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si a su hijo o hija se le ha

administrado este medicamento, pídale al médico información sobre los beneficios y los riesgos. Consulte con su médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

- Si tiene 60 años o más, use este medicamento con cuidado. Podría tener más efectos secundarios, como disminución de la sudoración, sobrecalentamiento y temperatura corporal elevada grave.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Parche cutáneo:

- El parche puede contener metal conductivo. Quíteselo antes de la resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).
- Algunas personas pueden presentar determinados signos al menos 24 horas después de retirarse el parche. Consulte al médico de inmediato si tiene vértigo, malestar estomacal o vómitos muy intensos, dolor de cabeza, problemas de equilibrio o para caminar, mareos muy intensos o desmayos, debilidad muscular o latidos cardíacos lentos.
- Con este medicamento se han producido temperaturas corporales elevadas y problemas de calor que pueden requerir tratamiento hospitalario. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. En la mayoría de los casos, la temperatura corporal elevada se produce en las 72 horas siguientes al primer uso de este medicamento. Evite el uso de fuentes de calor (como almohadillas eléctricas o mantas eléctricas). Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos o desmayos graves.
- Latido cardíaco acelerado.
- Problemas para orinar.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Ver halos o colores brillantes alrededor de las luces.
- Ojos irritados.
- Pupilas agrandadas.
- Convulsiones.
- Dificultad para hablar.
- Cambios mentales, anímicos o del comportamiento que son nuevos o que empeoran.
- Confusión.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Falta de aire.
- Sensación de calor.
- Fiebre.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.
- Llame al médico de inmediato si tiene dolor estomacal intenso que se extiende durante un tiempo o empeora. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor estomacal con fiebre, malestar estomacal o vómitos, cambios en la defecación, abdomen sensible, mareos muy intensos o pérdida de la conciencia, o sangre en la materia fecal.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Boca seca.
- Mareos o somnolencia.
- Diarrea.
- Náuseas.
- Dolor de garganta.
- Agitación.

Parche cutáneo:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Parche cutáneo:

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca ni los ojos (puede quemar).
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Coloque el parche sobre la piel seca y sin pelo detrás de la oreja. Asegúrese de saber cuándo ponerse el parche. Si no está seguro, consulte con el médico.
- Utilice solo un parche a la vez.
- No toque el parche mientras se encuentra sobre la piel.
- Tenga cuidado de no aflojar el parche mientras se ducha o baña.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.
- Si se utiliza para mareos y necesita el medicamento durante más de 3 días, deseche el parche viejo. Reemplácelo por uno nuevo y colóquelo detrás de la otra oreja.
- Al sacarse el parche, lávese la zona con agua y jabón.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.

Tabletas:

- Tráguela entera con un vaso lleno de agua.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Parche cutáneo:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe

con el horario habitual.

- No aplique más de un parche a la vez.
- Muchas veces este medicamento se utiliza según sea necesario. No lo utilice con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Tabletas:

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se toma según sea necesario. No lo tome con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Parche cutáneo:

- Conserve en posición vertical a temperatura ambiente.
- No doble ni enrolle la bolsa de aluminio.

Tabletas:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor y de la luz.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento

fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las

circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2025-06-27

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center