



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Semaglutide

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Ozempic (0.25 or 0.5 MG/DOSE); Ozempic (1 MG/DOSE); Ozempic (2 MG/DOSE); Rybelsus; Wegovy; Wegovy HD

Nombres comerciales: Canadá

Ozempic (0.25 or 0.5 MG/DOSE); Ozempic (1 MG/DOSE); Rybelsus; Wegovy; Wegovy FlexTouch

Advertencia

- Se ha demostrado que este medicamento ha causado cáncer de tiroides en algunos animales. No se sabe si esto sucede también en los seres humanos. Si se produce cáncer de tiroides, puede ser mortal si no se detecta y trata de manera temprana. Llame a su médico de inmediato si tiene una masa en el cuello, dificultad para respirar, dificultad para tragar o ronquera que no desaparece.
- No utilice este medicamento si tiene un problema de salud llamado síndrome de Neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 (MEN 2) o si usted o algún miembro de su familia tiene cáncer en las glándulas tiroides.
- Controle su función sanguínea y hágase ecografías de tiroides según le haya indicado el médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Plumas precargadas de Ozempic y comprimidos de Rybelsus:

- Se usa para ayudar a controlar el nivel de azúcar en sangre en las personas con diabetes tipo 2.

Tabletas Rybelsus:

- Se utilizan para reducir la probabilidad de que se produzca un ataque cardíaco, accidente cardiovascular y muerte en personas con diabetes de tipo 2 que están en riesgo por estos problemas.

Plumas precargadas de Ozempic:

- Se utiliza para reducir la probabilidad de ataque cardíaco, ictus y muerte en personas con diabetes de tipo 2 y problemas del corazón.
- Se utiliza para reducir la probabilidad de empeoramiento de los problemas renales y de muerte por problemas cardíacos en personas con diabetes tipo 2 y problemas renales.

Plumas precargadas y comprimidos de Wegovy:

- Se utiliza para ayudar a perder peso en determinadas personas.
- Se utiliza para reducir las posibilidades de presentar un ataque cardíaco, un derrame cerebral y la muerte en las personas con sobrepeso y enfermedades cardíacas.

Plumas precargadas de Wegovy:

- Se utiliza para tratar un determinado problema hepático denominado esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica no cirrótica (MASH).

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este

medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si alguna vez ha tenido pancreatitis.
- Si tiene un tránsito intestinal lento u otros problemas estomacales o intestinales.
- Si tiene o ha tenido depresión o pensamientos suicidas.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si usa otro medicamento como este. Si no está seguro, pregúntele al médico o al farmacéutico.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Si tiene diabetes tipo 1. No use este medicamento para tratar la diabetes tipo 1.

Tabletas:

- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Siga el plan de alimentación y el programa de ejercicio según las recomendaciones de su médico.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Si se someterá a alguna cirugía o procedimiento, consulte con el médico. Este medicamento puede aumentar el riesgo de que los alimentos lleguen a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que emplean anestesia o sedación profunda. Es posible que tenga que dejar de tomar este medicamento antes de este tipo de cirugías o procedimientos.
- Se han presentado problemas renales. En ocasiones, los problemas renales deberían tratarse en un hospital o mediante diálisis.
- Si no puede beber líquidos por la boca o tiene malestar estomacal, vómitos o diarrea que no desaparecen, deberá evitar deshidratarse. Comuníquese con el médico para obtener instrucciones. La deshidratación puede provocar presión arterial baja o problemas renales nuevos o que empeoren.
- No comparta plumas o dispositivos con cartucho con otras personas incluso si se ha cambiado la aguja. Es posible contagiar infecciones de una persona a otra al compartir estos dispositivos. Esto incluye infecciones que usted podría desconocer que tiene.
- Si tiene intención de embarazarse, consulte con su médico. Es posible que deba dejar de tomar este medicamento al menos 2 meses antes de quedar embarazada.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Use una identificación de alerta médica de la enfermedad.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- No conduzca si el contenido de azúcar en su sangre ha estado bajo. Existe un mayor riesgo de accidentarse.

- Las personas que toman este medicamento junto con otros fármacos para la diabetes pueden tener un mayor riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia grave puede causar convulsiones, desmayos, daño cerebral permanente y a veces la muerte. Consulte con el médico.
- Su nivel de azúcar en sangre puede resultar más difícil de controlar durante periodos de estrés como fiebre, infección, una lesión o una cirugía. Un cambio en la actividad física, ejercicio o alimentación también pueden afectar su nivel de azúcar en sangre.
- Informe al médico si está o podría estar embarazada.

Plumas precargadas de Ozempic:

- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

Plumas precargadas y comprimidos de Wegovy:

- Si es diabético, vigile cuidadosamente el nivel de azúcar en la sangre.
- Si tiene 75 años o más, tome este medicamento con cuidado. Puede tener una mayor probabilidad de fractura de cadera o pelvis.
- La pérdida de peso durante el embarazo puede ser la causa de originar daños al bebé no nato. Si se embaraza mientras está tomando este medicamento o si desea embarazarse, llame al médico inmediatamente.

Plumas precargadas de Wegovy:

- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Síntomas de problemas en la vesícula como dolor en el área abdominal superior derecha, el área del hombro derecho o entre los omóplatos, cambios en las heces; orina oscura o color amarillento en la piel o los ojos; o fiebre con escalofríos.
- Mareos o desmayos graves.
- Latido cardíaco acelerado.
- Cambio en la vista.
- Puede producirse un nivel bajo de azúcar en sangre. El riesgo puede ser mayor si toma este medicamento junto con algunos medicamentos para la diabetes. Los signos pueden ser mareos, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, temblores, ritmo cardíaco acelerado, confusión, hambre o sudoración. Llame al médico de inmediato si tiene cualquiera de estos signos. Siga las instrucciones que le han dado si presenta una baja de azúcar en la sangre. Esto incluye tomar tabletas de glucosa, glucosa líquida o algunos jugos de frutas.
- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas pancreáticos (pancreatitis) con este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene dolor estomacal, dolor de espalda o malestar estomacal intensos, o vómitos.
- Han ocurrido problemas de estómago graves con este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene problemas estomacales graves o que no desaparecen.

Comprimidos de Wegovy:

- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.

Plumas precargadas y comprimidos de Wegovy:

- Comportamiento nuevo o peor, o cambios de humor, como depresión o pensamientos suicidas.
- Dolor en la cadera o la pelvis.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal, o vómitos.

Tabletas:

- Disminución del apetito.

Plumas precargadas y comprimidos de Wegovy:

- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal, o vómitos.
- Dolor de cabeza.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Goteo nasal.
- Hinchazón de estómago.
- Eructos.
- Gases.

- Ardor de estómago.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tabletas:

- Tómese unos 30 minutos antes de la primera comida, bebida o medicamento del día.
- Administre este medicamento solo con agua. No lo tome con más de 4 onzas (120 mL) de agua.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper, triturar ni disolver.
- No tome más de 1 tableta al día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

Jeringas o plumas precargadas:

- Este medicamento se administra por inyección en la parte grasa de la piel, en la parte superior del muslo, en la zona abdominal o en la parte superior de brazo.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Tome este medicamento con o sin comida.

- Tómelo en el mismo día todas las semanas.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento es transparente e incoloro. No debe utilizarlo si la solución cambia de color.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Retire todas las cubiertas de las agujas de los cartuchos antes de inyectar una dosis (puede haber 2). Consulte al médico si no está seguro del tipo de aguja que debe usar con el cartucho.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Antes de cada dosis coloque una nueva aguja.
- Quite la aguja después de cada inyección. No almacene este dispositivo si está colocada la aguja.
- Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
- Si también usa insulina, puede inyectar este medicamento y la insulina en la misma zona del cuerpo pero no uno al lado del otro.
- No mezcle este medicamento en la misma jeringa de la insulina.
- Este producto puede producir chasquidos mientras prepara la dosis. No prepare la dosis contando los chasquidos. Hacer esto puede ocasionar que se utilice una dosis incorrecta.

Plumas precargadas de Wegovy:

- Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto luego de aplicar la dosis.
- No utilice este medicamento si se cayó o se está dañado.
- No moje este producto.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Tabletas:

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Jeringas o plumas precargadas:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible y continúe con el horario habitual.
- Si faltan menos de 48 horas para la dosis siguiente, saltee la dosis omitida y continúe con el horario habitual.
- No tome 2 dosis dentro de un plazo de 48 horas entre sí.
- Si se salta 2 dosis, comuníquese con el proveedor de salud médica.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Tabletas:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Jeringas o plumas precargadas:

- Conserve las jeringas sin abrir en el refrigerador. No congelar.
- No utilice el producto si se congeló.

Plumas precargadas de Ozempic:

- Luego de abrirlo, consérvelo en el refrigerador o a temperatura ambiente.

Deseche lo que no consumió luego de 56 días.

- Proteja del calor y de la luz.

Plumas precargadas de Wegovy:

- Puede conservar los contenedores sin abrir a temperatura ambiente. Si lo almacena a temperatura ambiente, deseche la parte no utilizada después de 28 días.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Proteja del calor.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-11-06

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Semaglutide - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center