



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Sildenafil

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Liqrev [DSC]; Revatio; Viagra

Nombres comerciales: Canadá

ACCEL-Sildenafil; AG-Sildenafil; APO-Sildenafil; AURO-Sildenafil; BIO-Sildenafil; JAMP-Sildenafil; JAMP-Sildenafil R; M-Sildenafil; Mar-Sildenafil; MINT-Sildenafil; NRA-Sildenafil; PMS-Sildenafil R; Priva-Sildenafil [DSC]; PRZ-Sildenafil; Revatio; RIVA-Sildenafil; TEVA-Sildenafil; TEVA-Sildenafil R; Viagra

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la disfunción eréctil (DE).
- Se utiliza para tratar la presión arterial elevada en los pulmones.
- Se le puede recetar este medicamento por otras

razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene un problema de salud llamado enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP).
- Si tiene ciertos problemas hereditarios en la vista como la retinitis pigmentosa.
- Si usa drogas llamadas “poppers” como el nitrito de amilo y el nitrito de butilo.
- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida, nitroglicerina, riociguat o vericiguat.
- Si toma otros medicamentos (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Existen muchos medicamentos que interactúan con este, como ciertos medicamentos para tratar, entre otros, el VIH, las infecciones y otros problemas de salud.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo

fármaco en su composición.

- Si toma otro medicamento como este para tratar la disfunción eréctil (DE) o la presión alta en los pulmones.

Para disfunción eréctil (DE):

- Si le han mencionado que no está lo suficientemente saludable como para tener relaciones sexuales.
- Si es mujer. Este medicamento no está aprobado para utilizarse en mujeres.
- Si el paciente es un niño. Este medicamento no está aprobado para su administración en niños.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este

medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- En muy pocas ocasiones, se han presentado efectos secundarios como latidos cardíacos anormales, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, hemorragia en los pulmones e hipertensión muy severa con este medicamento. En ocasiones, esto resultó mortal. Con frecuencia, estos problemas se produjeron en personas que padecían problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. Se desconoce si este medicamento causó estos problemas. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Este medicamento raramente ha provocado problemas

oculares graves. Algunos de estos pueden provocar un cambio en la vista y, a veces, la pérdida de esta, que puede no volver. Consulte con el médico.

- Si tiene enfermedad de células en hoz, hable con un proveedor de salud médica.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

Para disfunción eréctil (DE):

- Este medicamento no protege contra las infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales, como el VIH o la hepatitis. Para protegerse de estas infecciones, utilice un preservativo de látex o poliuretano.

Presión alta en los pulmones:

- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte,

al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Mareos o desmayos.
- Malestar estomacal intenso o vómitos.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Cambio en la vista.
- Pérdida de la visión.
- Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier otro cambio en la audición.

- Problema para respirar reciente o que empeoró.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Fiebre.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Llame al médico de inmediato si tiene una erección dolorosa (pene duro) o una erección que dura más de 4 horas. Esto puede ocurrir incluso si no está teniendo sexo. Si no se trata de inmediato, puede producir problemas sexuales duraderos y es posible que no pueda tener sexo.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Para todos los usos de este medicamento:

- Acaloramiento.
- Dolor de cabeza.
- Ardor de estómago.
- Náuseas.

- Goteo o congestión nasal.
- Dolor muscular.

Para disfunción eréctil (DE):

- Dolor de espalda.

Presión alta en los pulmones:

- Diarrea.
- Hemorragia nasal.
- Dolor de espalda, brazos o piernas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Tome este medicamento con o sin comida.

Para disfunción eréctil (DE):

- Tome este medicamento antes de tener sexo cuando su médico se lo indique. Hable con su médico si no está seguro de cuándo tomar este medicamento.
- No utilice una dosis mayor a la indicada en la receta. No lo utilice con mayor frecuencia o durante más tiempo del indicado. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios muy graves.

Tira oral:

- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- Coloque la película sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. Si se usa más de 1 película, deje que cada película se derrita completamente antes de usar la siguiente.
- Deje que la película se disuelva por completo antes de tragarla. No mastique ni parta la película. No trague la película entera.

Presión alta en los pulmones:

- Siga tomando este medicamento según se lo indique

el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

Líquido (suspensión):

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Asegúrese de saber qué tipo de dispositivo de medición utilizar y cómo medir la dosis. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intravenosa.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Para disfunción eréctil (DE):

- Este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.
- No tome 2 dosis el mismo día.

Presión alta en los pulmones:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Líquido (suspensión):

- Conserve a temperatura ambiente. No lo congele. Algunas marcas de este medicamento se pueden almacenar en el refrigerador. Consulte a su farmacéutico si su marca puede almacenarse en el refrigerador.
- Algunas marcas de este medicamento se deben desechar 60 días después de su mezcla. Algunas marcas se deben desechar 90 días después de su apertura. Escriba la fecha de apertura del envase en la etiqueta del mismo. Asegúrese de saber cuánto tiempo puede conservar su medicamento antes de tener que desecharlo.

Comprimidos y película oral:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las

circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-02-24

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sildenafil - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center