



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Sodium Phenylbutyrate

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Buphenyl; Olpruva; Pheburane

### **Nombres comerciales: Canadá**

Pheburane

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar trastornos del ciclo de la úrea.
- Este medicamento no debe utilizarse para tratar niveles elevados repentinos de amoníaco. Asegúrese de conocer los signos de niveles elevados de amoníaco. Los niveles elevados repentinos de amoníaco requieren atención médica de urgencia y pueden ser mortales. Consulte con el médico.

### **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este**

## medicamento?

### Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene problemas de salud hereditarios poco frecuentes como mala absorción de glucosa-galactosa, intolerancia a la fructosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa. Algunos de estos productos contienen sacarosa.
- Si toma cualquiera de los siguientes medicamentos: divalproex, haloperidol o ácido valproico.

### Niños:

- Si su hijo pesa menos de 20 kg (44 libras). Algunas marcas no deben administrarse en niños que pesen menos de 20 kg (44 libras).

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este

medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Siga el plan de alimentación según las recomendaciones de su médico.
- Use una identificación de alerta médica de la enfermedad.
- Si está realizando una dieta con bajo contenido de sodio o sin sodio, hable con el médico. Algunos de estos productos tienen sodio.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el

bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de niveles elevados de ácido en sangre (acidosis) como confusión; respiración acelerada; frecuencia cardíaca acelerada; frecuencia cardíaca que no se siente normal; dolor estomacal muy intenso, malestar estomacal o vómitos; mucho sueño; falta de aire; mucho cansancio o debilidad.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de

humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.

- Se siente muy cansado o débil.
- Mareos o dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Somnolencia.
- Confusión.
- Cambios en la audición.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Inflamación.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Disminución del apetito.
- Sabor anormal.
- Cambios en el olor del cuerpo.
- No hay menstruación o hay cambios en el período (menstrual).

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Polvo y tabletas:**

- Tome este medicamento con la comidas.

### **Polvo:**

- Agite antes de usar.
- Mezcle el polvo con líquidos o alimentos blandos.
- Utilice sólo la cucharilla provista para medir el polvo.
- Si se mezcla con alimentos, tome la dosis de inmediato. No lo almacene para usar más adelante. Si se mezcla con agua, puede conservarse a temperatura ambiente o en el refrigerador hasta 1 semana.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

### **Gránulos orales:**

- Tome este medicamento con alimentos.

### **Gránulos orales (frasco):**

- Utilice únicamente el medidor que viene con este medicamento.
- Trague los gránulos con una bebida, como agua, zumo de frutas o fórmula infantil sin proteínas. También puede espolvorear los gránulos sobre una cucharada de salsa de manzana o puré de zanahoria. No mastique los gránulos. No mezcle los gránulos con un líquido. Trague los gránulos inmediatamente.

- Si tiene una sonda de alimentación, hable con su médico antes de tomar este medicamento.

### **Gránulos orales (paquetes):**

- Este medicamento viene con 2 paquetes por cada dosis. Uno de los paquetes contiene un adyuvante de mezcla para facilitar la disolución del medicamento en el agua. El otro paquete contiene el medicamento. Asegúrese de saber qué paquete contiene el adyuvante de mezcla y qué paquete contiene el medicamento.
- Para mezclar este medicamento, vierta primero el contenido del sobre de adyuvante de mezcla en agua en una taza. La cantidad de adyuvante de mezcla y agua a utilizar depende de la dosis. Asegúrese de saber cuánto utilizar. Remueva hasta que se disuelva. A continuación, añada el contenido del paquete con este medicamento y remueva.
- Beba toda la dosis en los 5 minutos siguientes a removerla. Después de beber, vierta más agua en la taza y beba para asegurarse de que tomó toda la dosis. Asegúrese de saber cuánta agua adicional debe utilizar.
- Si no ha tomado este medicamento en los 30 minutos siguientes a la mezcla, deséchelo.
- Si tiene una sonda de alimentación, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Este

medicamento no es para uso con todos los tipos de sondas de alimentación.

## **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

### **Polvo y tabletas:**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible, con una de las comidas.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Gránulos orales (frasco):**

- Tome la dosis que se salteó lo antes posible, con alimentos.
- Si faltan menos de 3 horas para la dosis siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Gránulos orales (paquetes):**

- Tome con alimentos la dosis omitida apenas se dé cuenta, el mismo día en que la omitió.
- Si no acuerda de la dosis que se salteó hasta el día siguiente, omita la dosis que se salteó y vuelva a su

horario normal.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### Gránulos orales (frasco), polvo y tabletas:

- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.

### Gránulos orales (frasco):

- Deseche las partes que no haya utilizado después de 45 días de haberlo abierto.

### Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los

medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2025-11-03

## **Derechos de autor**

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Sodium Phenylbutyrate - Last updated on December 12, 2022  
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center