



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Clenpiq

Nombres comerciales: Canadá

Oral Purgative; Pico-Salax; Picodan; Picroflo; Purg-Odan

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para limpiar el tubo digestivo.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene alguno de los siguientes trastornos: obstrucción intestinal, inflamación del colon, un orificio en el tubo digestivo, tránsito lento a través del tubo digestivo.
- Si tiene enfermedad renal.
- Si tiene deshidratación o problemas de electrólitos.
- Si está tomando algún otro laxante.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si tiene riesgo de sufrir latidos cardíacos anormales, hable con su médico. Su médico puede pedirle un electrocardiograma (ECG) antes y después de utilizar

este medicamento.

- No use otros laxantes o ablandadores de heces, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.
- Algunos pacientes se han deshidratado y desmayado mientras tomaban este medicamento. Los desmayos pueden provocar caídas y lesiones graves (como una lesión en la cabeza o una fractura de huesos). Asegúrese de beber suficientes líquidos claros mientras toma este medicamento. Levántese lentamente si ha estado sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al

tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Hinchazón de estómago.
- Hinchazón del vientre.
- Cólicos abdominales.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Sangramiento del recto o dolor en el recto.
- Dificultad para tragar.
- Es posible que este medicamento le produzca deshidratación o problemas de electrólitos. En raras ocasiones, esto puede ser grave o mortal. Informe a su médico de inmediato si se marea, se desmaya, siente cansancio o debilidad o no puede orinar. Informe al

médico de inmediato si tiene una frecuencia cardíaca acelerada o anormal, convulsiones, dolor de cabeza, cambios de humor, confusión, dolor o debilidad muscular, aumento de la sed, disminución del apetito, tiene la boca o los ojos secos, sufre de malestar estomacal intenso o vómitos o experimenta cambios en la cantidad de orina producida.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento según le indique su médico. Siga cuidadosamente todas las instrucciones recibidas. Esto incluye cuándo tomar el medicamento, los alimentos y bebidas que debe evitar antes del examen, y cuándo debe comenzar el ayuno líquido y sólido antes del examen. Consulte con su médico si tiene preguntas.
- No ingiera alimentos sólidos ni tome productos lácteos como la leche mientras está tomando este medicamento.
- Beba más líquidos después de cada dosis de este medicamento. Asegúrese de saber cuánto líquido quiere el médico que beba después de cada dosis.
- Beba varios tipos de líquidos claros antes y después de tomar este medicamento, y mientras lo toma. No beba solo agua. Asegúrese de que 1 otro tipo de líquido claro sea una solución electrolítica como una bebida

deportiva. Otros líquidos claros son el café negro o el té (sin leche ni crema), el caldo claro, el jugo claro sin pulpa, la gaseosa de jengibre, otros refrescos, la gelatina sin sabor y las barras de jugo congeladas.

- NO beba líquidos, gelatinas o barras de jugo de color morado o rojo. No beba leche o alcohol.
- Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes del examen, a menos que el médico le indique lo contrario.
- Si tiene dolor abdominal grave, inflamación o hinchazón después de la primera dosis, no tome la segunda dosis hasta que estos síntomas desaparezcan. Hable con su médico.
- No tome otros medicamentos por vía oral durante la hora anterior a cada dosis de este medicamento. Es posible que algunos medicamentos deban aplazarse por más tiempo después de este medicamento. Consulte al médico sobre cómo tomar otros medicamentos junto con este.

Polvo para solución:

- Mezcle con agua como se le indicó antes de tomar este medicamento. No trague el talco.
- Después de mezclar, tome su dosis de inmediato. No almacene para usar en el futuro.

- No agregue hielo a la solución mezclada.

Líquido (solución):

- Este medicamento está listo para beberse. No es necesario diluir este medicamento antes de tomarlo.
- La solución es transparente y es posible que vea algunas partículas en ella. Esto es normal.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.
- Llame al médico si no puede terminar este medicamento antes del examen.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Polvo para solución:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Después de mezclar, no refrigerar.

Líquido (solución):

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.

Todas las presentaciones:

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga

todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o

medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-03-05

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center