



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Somapacitan

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Sogroya

Nombres comerciales: Canadá

Sogroya

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la insuficiencia de la hormona del crecimiento.
- Se utiliza para favorecer el crecimiento en ciertos niños.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas para respirar como apnea del sueño; cáncer u otros tumores como un tumor cerebral; enfermedad diabética del ojo; o enfermedad poco después de cirugía a corazón abierto, cirugía de estómago o lesión accidental.

Niños:

- Si los huesos de su hijo ya no crecen (epífisis cerradas)
- Si su hijo tiene el síndrome de Prader-Willi.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Realice los análisis de sangre y exámenes de la vista como le indicó su médico.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o que empeora.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Si tiene cáncer o un tumor, o alguna vez ha tenido cáncer o un tumor, consulte al médico. La probabilidad de tener cáncer o un crecimiento de tumores aumenta con la administración de este medicamento. La probabilidad de tener nuevos tumores también puede aumentar en algunos pacientes.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Niños:

- Si su hijo tiene una curvatura anormal en la columna vertebral (escoliosis), hable con su médico. Este medicamento puede empeorarla en niños que aún estén en edad de crecimiento.
- Si su hijo tiene el síndrome de Prader-Willi, consulte al médico. Se han producido muertes súbitas en niños con síndrome de Prader-Willi que también presentaban sobrepeso importante o en aquellos que padecían una infección en los pulmones o las vías respiratorias, o que habían sufrido una obstrucción en estas o apnea del sueño.
- Use este medicamento con precaución en los niños. Pueden provocarles más efectos secundarios. Consulte al médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Síntomas de una glándula suprarrenal débil, como náuseas o vómitos muy fuertes, mareos fuertes o desmayos, debilidad muscular, sensación de cansancio, cambios de humor, disminución del apetito o pérdida de peso.
- Signos de niveles tiroideos bajos como estreñimiento, problemas para manejar el frío, problemas de memoria, cambios de estado de ánimo o una sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo que no es normal.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Sudoración excesiva.
- Cambios de conducta.
- Cambios en el color de la piel.
- Cambios de color o tamaño del lunar.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Inflamación.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Ardor, adormecimiento, dolor u hormigueo en las manos, brazos, muñecas, piernas o pies.
- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Ruptura de la piel en el lugar en que se aplicó el medicamento.
- Amígdalas agrandadas.
- Se siente muy cansado o débil.
- Este medicamento rara vez provocó un aumento de la presión en la cabeza. La mayoría de las veces, los signos aparecieron dentro de las primeras 8 semanas después de comenzar a tomar este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene algún cambio en la visión, dolor de cabeza

intenso, malestar estomacal o vómitos.

Niños:

- Los niños que tomaban este medicamento rara vez tuvieron un problema óseo en la cadera (desplazamiento de la placa de crecimiento). Esto también puede provocar más lesiones óseas. Llame al médico de inmediato si su hijo/a tiene dolor en la cadera o la rodilla, o cojea.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de espalda, brazos o piernas.
- Ardor de estómago.
- Problemas para dormir.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Aumento de peso.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor de cabeza.
- Signos de un resfrío común.
- Fiebre leve.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Se administra por inyección en la parte grasa de la piel de la parte superior del brazo, muslo, glúteos o el área del estómago.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Tómelo en el mismo día todas las semanas.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Retire todas las cubiertas de las agujas de los cartuchos antes de inyectar una dosis (puede haber 2). Consulte al médico si no está seguro del tipo de aguja que debe usar con el cartucho.
- Este producto puede producir chasquidos mientras prepara la dosis. No prepare la dosis contando los chasquidos. Hacer esto puede ocasionar que se utilice una dosis incorrecta.
- Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
- Este medicamento es de transparente a ligeramente nacarado. No lo tome si la solución está turbia, gotea o tiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Quite la aguja después de cada inyección. No almacene este dispositivo si está colocada la aguja.
- No comparta este medicamento con otra persona. Esto incluye agujas y jeringas, incluso si se cambió la aguja. Es posible contagiar infecciones de una persona a otra al compartir estos dispositivos. Esto incluye infecciones que usted podría desconocer.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se omitió lo antes posible. Después de tomar una dosis omitida, tome la siguiente dosis en su día normal.
- Si se olvida de la dosis durante más de 3 días, sátese la dosis olvidada. Tome la próxima dosis el día habitual.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- No utilice el producto si se congeló.
- Si se almacena en el refrigerador, deseche cualquier medicamento que quede 6 semanas después de abrirlo.
- Si fuera necesario, este medicamento puede permanecer a temperatura ambiente durante 72 horas como máximo. Este medicamento se puede volver a guardar en el refrigerador. Deseche el medicamento si se lo ha dejado a temperatura ambiente durante más de 72 horas.
- Proteja del calor y de la luz solar.
- Deseche el medicamento si se guardó a una temperatura superior a 86 °F (30 °C).
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-03-31

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Somapacitan - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).