



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Treprostinil

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Orenitram; Orenitram Month 1; Orenitram Month 2; Orenitram Month 3; Remodulin; Tyvaso; Tyvaso DPI Institutional Kit; Tyvaso DPI Maintenance Kit; Tyvaso DPI Titration Kit; Tyvaso Refill Kit; Tyvaso Starter Kit; Yutrepia

### **Nombres comerciales: Canadá**

Remodulin

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Se utiliza para tratar la presión arterial elevada en los pulmones.

### **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos,

alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene enfermedad hepática.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo

sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.

- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- No deje de consumir este medicamento de forma repentina sin consultar con su médico. Es posible que los signos de presión alta en los pulmones como falta de aire, mareos o debilidad empeoren. Consulte con su médico.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### **Tabletas:**

- La cobertura de la tableta no se disuelve. Si tiene un determinado problema intestinal (diverticulosis), esto puede ser un problema. Consulte al médico.

### **Infusión:**

- Es posible que las personas que reciben este medicamento mediante una infusión intravenosa estén

expuestas a un mayor riesgo de contraer una infección muy grave. Este tipo de infecciones pueden ser letales. Consulte al médico.

- Si tiene síntomas de abstinencia o si cree que la bomba no funciona bien, obtenga ayuda médica de inmediato.

### **Infusión y líquido para inhalar:**

- Siempre tenga un sistema de respaldo cerca en caso de que necesite usarlo.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### **Todas las presentaciones:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para

respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de hemorragia como vomitar o toser sangre, vómito que parece café molido, sangre en la orina, heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado de las encías, sangrado vaginal anormal, moretones sin causa o que se agrandan, o sangrado que no puede detener.
- Mareos o desmayos graves.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.

### **Tabletas:**

- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.

### **Infusión:**

- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Ansiedad.
- Agitación.
- Dolor e irritación en la zona en la que el medicamento entra al cuerpo.

- Hinchazón del brazo.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Todas las presentaciones:**

- Mareos o dolor de cabeza.
- Acaloramiento.
- Dolor de mandíbula.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.

### **Tabletas:**

- Dolor en los brazos o las piernas.
- Dolor de estómago.
- Es posible que vea la cobertura de la tableta en las heces. Esto es normal y no es motivo de inquietud.

### **Infusión:**

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

### **Todos los productos para inhalar:**

- Tos.

### **Solución para inhalar:**

- Irritación de la garganta.
- Dolor muscular.
- Dolor de huesos.

### **Capsulas para inhalar:**

- Irritación de la garganta.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Tabletas:**

- Tome este medicamento con alimentos.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- No tome tabletas que estén astilladas o rotas.

## **Infusión:**

- Este medicamento se administra en una vena o en la capa grasa de la piel en forma constante.
- Su proveedor de salud médica puede enseñarle cómo administrar este medicamento.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Es posible que deba mezclar este medicamento con otro líquido antes de usarlo. Si lo hace, asegúrese de que sea el tipo de líquido correcto. Consulte al médico o el farmacéutico si no está seguro.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

## Solución para inhalar:

- Para enviar oxígeno a los pulmones únicamente a través del sistema de inhalación *Tyvaso*.
- Después de la última dosis del día, deseche todo medicamento que haya sobrado en la cámara de modo que quede preparado para el día siguiente.
- No mezcle otros medicamentos en el nebulizador.
- Si este medicamento entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua.

## Inhalador:

- Para enviar oxígeno a los pulmones únicamente con el inhalador DPI *Tyvaso*.
- El médico le enseñará cómo tomar este medicamento. Asegúrese de saber cuánto debe tomar, con qué frecuencia y cómo debe almacenar este medicamento. Si el médico no le informa cómo usar este medicamento o si no está seguro de cómo hacerlo, consulte al médico.
- Si el medicamento o el inhalador están guardados en el frigorífico, sáquelos y déjelos a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos antes de utilizarlos.
- No trague el cartucho.
- Guarde el inhalador vacío con la boquilla colocada.

- Si es necesario limpiar el inhalador, limpie el exterior solamente con un paño limpio y seco. No enjuague ni lave. Mantenga siempre seco el inhalador.

## **Capsulas para inhalar:**

- No trague la cápsula. El contenido de la cápsula se inhalará hacia los pulmones.
- Utilice únicamente el dispositivo que viene con el medicamento. No utilice otros dispositivos.
- Lávese las manos antes de usar.
- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- No retire este medicamento del blíster hasta que esté listo para usarlo. No guarde el medicamento que retiró del blíster para usarlo posteriormente.
- No abra las cápsulas.
- Inhale el contenido de la cápsula en los 5 minutos siguientes a la apertura del blíster.
- Si su dosis es superior a 1 cápsula, cargue e inhale solo 1 cápsula cada vez.
- No lave el dispositivo. Mantenga la boquilla siempre seca.
- Si este medicamento entra en contacto con los ojos o la

piel, enjuague con agua.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

### Infusión:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### Todos los productos para inhalar:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### Tabletas:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible, con alimentos.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si se salta 2 dosis, comuníquese con el proveedor de salud médica.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

### Infusión:

- Conserve los viales no abiertos a temperatura ambiente.
- Proteja de la luz.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Luego de abrir o mezclar este medicamento con líquidos, asegúrese de saber cómo almacenar este medicamento y por cuánto tiempo puede hacerlo.

### **Inhalador:**

- Conserve el inhalador vacío en el refrigerador o a temperatura ambiente. Deseche el inhalador a los 7 días de uso y obtenga uno nuevo.
- Conserve los blísteres sin abrir en el refrigerador. También pueden conservarse a temperatura ambiente hasta 8 semanas.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.
- Conserve los blísteres abiertos a temperatura ambiente. No enfríe. Deséchelos si no se usan en 3 días.

### **Todas las demás presentaciones:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

### **Capsulas para inhalar:**

- Guarde este medicamento en el blíster adjunto.
- Deseche el inhalador vacío luego de 7 días de uso y empiece a usar uno nuevo.
- El blíster también puede contener un desecante para ayudar a mantener seco el medicamento. No coma ni trague el desecante.

### **Solución para inhalar:**

- Guarde los envases no utilizados en una bolsa de papel aluminio hasta su uso.
- Proteja de la luz.
- Deseche la porción no utilizada de un sobre abierto luego de 7 días.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse

como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

**Última fecha de revisión**

2025-06-12

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Treprostnil - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center