



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Varenicline (Systemic)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

APO-Varenicline; Chantix; Chantix Continuing Month Pak;
Chantix Starting Month Pak

Nombres comerciales: Canadá

APO-Varenicline; Champix Starter Pack [DSC]; Champix [DSC]; MINT-Varenicline; MINT-Varenicline Starter Pack;
NRA-Varenicline; TEVA-Varenicline

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para ayudar a dejar de fumar.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de

esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si el paciente es un/a niño/a. No administre este medicamento a niños.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Se han producido accidentes, como accidentes de tránsito, en personas que tomaban este medicamento. Hable con su médico.

- No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Cuando haya dejado de fumar, otros medicamento se pueden afectar. Comuníquese con el proveedor de salud médica.
- Si tiene o alguna vez ha tenido convulsiones, hable con el proveedor de salud médica.
- Es posible que tenga signos de abstinencia de nicotina al tratar de dejar de fumar incluso al usar medicamentos como este para dejar el hábito. Existen varios signos de abstinencia de nicotina. En pocas ocasiones ha habido depresión e ideas suicidas en personas que intentan dejar de fumar. Consulte con su médico.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los

siguiientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Falta de aire.
- Confusión.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Convulsiones.
- Este medicamento ha producido sonambulismo. A veces esto puede ocasionar lesiones personales o a terceros. Llame al médico de inmediato si empieza a tener sonambulismo.
- Se ha producido una reacción muy grave llamada angioedema con la administración de este medicamento. A veces, esto podría poner su vida en riesgo. Los signos pueden incluir hinchazón de las manos, la cara, los labios, los ojos, la lengua o la garganta; problemas para respirar; problemas para

tragar; o una ronquera inusual. Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene cualquiera de estos signos.

- Se pueden producir reacciones cutáneas graves con este medicamento. Estas incluyen el síndrome de Stevens-Johnson (Stevens-Johnson syndrome, SJS) y otras reacciones graves. Algunas reacciones pueden poner en riesgo la vida. Busque ayuda médica de inmediato si presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.
- Este medicamento ha provocado problemas nuevos o graves en los vasos sanguíneos. Esto incluye ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La mayoría de las veces, se produjo en personas que ya habían tenido problemas cardíacos o de los vasos sanguíneos. Llame al médico de inmediato si tiene signos de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho que se puede extender a los brazos, cuello, mandíbula, espalda o estómago; sudoración que no es normal; náuseas o vómitos. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de accidente cerebrovascular como debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar, ver o equilibrarse, sensación de confusión, caída en 1 lado de la cara o dolor

de cabeza muy intenso.

- Con este medicamento se presentaron problemas mentales, anímicos o del comportamiento, o bien, empeoraron los ya existentes. Estos problemas incluyen pensamientos suicidas u homicidas, depresión, reacciones violentas, furia, ansiedad e ira. Estos problemas se presentaron en personas con o sin antecedentes de problemas mentales o anímicos. Vigile atentamente a las personas que usan este medicamento. Llame al médico de inmediato si cree tener alguno de estos problemas. Llame al médico de inmediato si tiene algún otro signo como nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico o cambios de humor o reacciones nuevas o que empeoran.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Estreñimiento.
- Dolor de estómago.

- Gases.
- Boca seca.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Problemas para dormir.
- Sueños extraños o peculiares.
- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- Signos de un resfrión común.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Busque asesoramiento para mejorar sus probabilidades de abandonar el hábito de fumar.
- Tómelo después de la comida con un vaso lleno de agua.
- Hay diferentes maneras de utilizar este medicamento para ayudarlo a dejar de fumar. Consulte con su médico sobre cuándo comenzar el tratamiento con este medicamento y cuándo dejar de fumar.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el

farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en
<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión
2025-02-18

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Varenicline (Systemic - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center