



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Warfarin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Jantoven

Nombres comerciales: Canadá

APO-Warfarin; TARO-Warfarin

Advertencia

- Este medicamento puede ocasionar hemorragias muy graves y, a veces, mortales. Consulte al médico.
- Comuníquese inmediatamente con su médico si tiene síntomas de problemas de hemorragias, como hematomas; heces negras, alquitranadas o con sangre; encías sangrantes; sangre en la orina; tos con sangre; cortes que dejan de sangrar después de mucho tiempo; mareos; cansancio o debilidad; hemorragias nasales; dolor o inflamación; vómitos

con sangre o vómitos que parecen granos de café; o dolor de cabeza muy fuerte.

- Llame al médico inmediatamente si presenta un sangrado vaginal anormal o períodos (menstruaciones) muy abundantes.
- Necesitará controlar sus análisis de sangre (Tiempo de protrombina [TP]/Relación normalizada internacional [INR]) cuando consuma este medicamento. Esto es importante para asegurarse de que el medicamento funcione correctamente y para controlar su riesgo de sufrir una hemorragia. Controle su TP/RNI tal y como lo indicó su médico u otro proveedor de atención médica. Si no está seguro cuándo necesita controlar su TP/INR, comuníquese con su médico u otro proveedor de atención médica.
- Su dieta y algunos de los medicamentos pueden afectar su nivel de PT/INR. Consulte a su médico.
- Evite las actividades o los deportes que puedan aumentar el riesgo de lesión o hemorragias.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se indica para tratar o prevenir los coágulos de sangre.

- se consumen para disminuir el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte en algunas personas.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los siguientes trastornos: Problemas de los vasos sanguíneos, como aneurisma o aorta cortada; problemas de hemorragia; hemorragia en el cerebro; úlcera activa; hemorragia en el estómago, el intestino, el tracto urinario, los genitales o las vías respiratorias; problemas en la sangre; infección cardíaca; recuento bajo de plaquetas; pericarditis, cirugía reciente del ojo, cerebro o columna vertebral o presión arterial demasiado alta.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: una enfermedad cardíaca específica conocida como preeclampsia, convulsiones durante el embarazo (eclampsia), inducción del parto o amenaza de aborto espontáneo.
- Si se va a someter a una intervención quirúrgica,

consulte al proveedor de salud médica.

- Si va a recibir anestesia o un tratamiento en la columna vertebral.
- Si le han dado anestesia espinal, se ha sometido a cirugía mayor o algún tipo de procedimiento espinal, consulte al médico.
- Si sabe que no tomará el medicamento ni se controlará los análisis de sangre (TP/INR) según las indicaciones del médico.
- Si ha tenido un recuento bajo de plaquetas causado por la heparina.
- Si está embarazada.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas. Es posible que se deba suspender la administración de este medicamento antes de determinados tipos de cirugía tal como se lo informó su médico. Si se suspende la administración de este medicamento, su médico le comunicará cuándo debe comenzar a tomar este medicamento nuevamente luego de la cirugía o procedimiento.
- Tenga cuidado para evitar lesiones y evitar caídas o accidentes.
- Si se cae o se lastima, o si se golpea la cabeza, comuníquese con su médico de inmediato. Consulte con su médico, incluso si se siente bien.
- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Hable con su médico antes de usar productos que contengan aspirina, anticoagulantes, ajo, ginseng, ginkgo, ibuprofeno o productos similares a este, analgésicos o vitamina E.
- Ciertos alimentos pueden afectar sus niveles de TP/INR.

Siga el plan de alimentación que le indicó su médico u otro proveedor de atención médica.

- Consulte a su médico sobre la cantidad de vitamina K en su dieta. La vitamina K puede alterar el funcionamiento del medicamento. No debe evitar todos los alimentos con vitamina K. Sin embargo, deberá mantener la misma cantidad de alimentos con vitamina K en su dieta diaria. Muchos alimentos contienen vitamina K. Estos incluyen algunas verduras de hoja verde, brócoli, hígado y algunos aceites vegetales. Pida al médico la lista de los alimentos que contienen vitamina K. No haga grandes cambios en su dieta normal sin consultarlo con su médico.
- Consulte al médico antes de tomar multivitamínicos, productos naturales y suplementos nutricionales. Podrían contener vitamina K.
- Lleve la tarjeta de seguridad del paciente con usted en todo momento.
- Llame a su médico de inmediato si tiene diarrea, fiebre o una infección.
- Si comienza o deja de fumar, consulte al médico. Es posible que la cantidad de medicamento que toma sea modificada.
- Con este medicamento se ha producido un problema de

salud muy grave y en ocasiones mortal relacionado con la piel (calcifilaxis). Esto ha ocurrido en personas con y sin problemas renales muy graves. Consulte con el médico.

- Si usted es asiático, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Si tiene más de 60 años, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Este medicamento puede causar daño al feto. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.
- Si puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 1 mes después de su última dosis. Si queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los

siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Dolor de pecho.
- Mareos o desmayos graves.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.
- Dolor de cabeza intenso.
- Se siente muy cansado o débil.
- Inflamación.
- Cambio del color de la piel a negro o morado.
- Rara vez se produce muerte del tejido cutáneo. Esto puede causar la pérdida de la parte del cuerpo

(amputación) y puede ser mortal. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor, o cambio de color o de temperatura en alguna parte del cuerpo.

- Si tiene problemas renales o ha tenido problemas renales en el pasado, consulte al médico. Pueden ocurrir problemas renales. Consulte con su médico de inmediato si presenta signos de problemas renales como incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque ayuda médica si padece efectos secundarios molestos o que no desaparecen.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al

1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Use este medicamento según se lo indiquen, aun si se siente bien. Esto es importante para que el medicamento funcione correctamente y para disminuir el riesgo de hemorragias.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Las personas embarazadas no deben tocar las pastillas trituradas o partidas. Si una persona embarazada toca una tableta triturada o rota, lave el área con agua y jabón de inmediato.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó cuanto antes se dé cuenta el mismo día en que se la saltó.
- Si no acuerda de la dosis que se salteó hasta el día siguiente, omita la dosis que se salteó y vuelva a su horario normal.
- No tome más de 1 dosis de este medicamento dentro el

mismo día.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-07-14

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Warfarin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center