

## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Baclofen

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Baclofen Refill Kit-SynchroMed; Fleqsuvy; Gablofen; Lioresal; Lyvispah [DSC]; Ozobax DS; Ozobax [DSC]

### **Nombres comerciales: Canadá**

APO-Baclofen; Baclofen-10; Baclofen-20; JAMP-Baclofen; Lioresal Intrathecal [DSC]; MYLAN-Baclofen; PMS-Baclofen; RIVA-Baclofen

## **Advertencia**

### **Infusión:**

- Se han informado efectos perjudiciales cuando este medicamento se suspendió repentinamente. Algunos de estos efectos secundarios fueron fiebre fuerte, cambios mentales, más espasmos y rigidez muscular. Rara vez estos efectos secundarios generaron problemas musculares muy graves, problemas de órganos o la muerte. Evite suspender este medicamento repentinamente sin hablar antes con el médico. Asegúrese de resurtir el pulverizador del niño a tiempo, de saber cuáles son las alarmas del pulverizador y de saber qué debe hacer si se dispara la alarma. Dígale al médico si el niño alguna vez ha mostrado signos de abstinencia mientras recibía tabletas o inyecciones de baclofeno. Llame al médico de inmediato si el niño tiene signos de abstinencia.
- Para mayor información lea el prospecto adjunto al medicamento.

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar espasmos en pacientes con EM (esclerosis múltiple) o problemas de la

médula espinal.

- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

**¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?**

**Todas las presentaciones:**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

**Infusión:**

- Si el niño tiene una infección.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el

médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Estos pueden incluir alucinaciones (ver u oír cosas que no existen),

convulsiones, fiebre alta, rigidez muscular y sensación de confusión. En raras ocasiones, esto puede provocar problemas en los órganos e incluso la muerte. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según las indicaciones del médico. Informe al médico de inmediato si su hijo tiene algún signo nuevo o que haya empeorado.

- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Tomar este medicamento durante el embarazo puede causar abstinencia en el recién nacido.

### **Inyección:**

- Consulte al médico de su hijo si este medicamento deja de surtir efecto. No administre más de lo que se le indicó.

**¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos o desmayos graves.
- Confusión.
- Cambios mentales, anímicos o del comportamiento que son nuevos o que empeoran.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Convulsiones.
- Modificación del equilibrio.
- Cambio en la vista.
- Dolor de pecho.

- Dolor muscular o debilidad.
- Tensión muscular.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Cambio en la frecuencia con la que orina.
- Sangre en la orina.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Pulso que no se siente normal.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Problemas para dormir.
- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

#### **Tabletas:**

- Administre este medicamento con o sin alimentos.

#### **Todos los productos líquidos:**

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el

medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

- No utilice cucharas soperas o cafeteras comunes para medir este medicamento. Si lo hace podría administrar una dosis demasiado alta.

### **Líquido (suspensión):**

- Agite bien antes de usar.
- Las personas que tienen sondas de alimentación pueden usar algunas marcas de este medicamento. Si su hijo tiene una sonda de alimentación, asegúrese de saber si se puede usar la marca de hijo. Administre este medicamento según se le ha indicado. Enjuague la sonda de alimentación luego de administrar este medicamento.

### **Gránulos orales:**

- Este medicamento se puede poner directamente en la boca de su hijo. Los gránulos se disuelven en la boca, o su hijo puede tragarlos. Si es necesario, este medicamento también se puede mezclar con líquidos o alimentos blandos como puré de manzana, yogur o budín. Mezcle 1 paquete en hasta 1 cucharada (15 ml) de líquido o alimento blando. Si la dosis de su hijo es de más de 1 paquete, mezcle cada paquete por separado.

Administre este medicamento dentro de las 2 horas posteriores a la mezcla.

- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

### **Infusión:**

- Este medicamento se administra en la espina dorsal.

### **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

#### **Todos los productos orales:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

### **Infusión:**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

#### **Tabletas:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Si divide las tabletas, es posible que deba tirarlas después de un cierto tiempo. Asegúrese de saber por cuánto tiempo puede almacenar las tabletas divididas. Si no está seguro, llame al farmacéutico.

### **Líquido (solución):**

- Algunas marcas de este medicamento se almacenan en el refrigerador. Algunas marcas de este medicamento se almacenan a temperatura ambiente. Pregúntele a su farmacéutico cómo almacenar este medicamento.
- No congelar.
- Proteja de la luz.

### **Líquido (suspensión):**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Deseche la porción que no utilice 2 meses después de abrir el medicamento.

### **Gránulos orales:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

### **Infusión:**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable

con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o

medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

### **Última fecha de revisión**

2025-07-14

### **Derechos de autor**

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Baclofen - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center