

# Barium

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

E-Z-Disk; E-Z-HD; E-Z-Paque; E-Z-Paste [DSC]; Liquid E-Z-Paque; Liquid Polibar Plus [DSC]; NeuLumEX [DSC]; Readi-Cat 2; Tagitol V; Vanilla SilQ; Varibar Honey; Varibar Nectar; Varibar Pudding; Varibar Thin Honey; Varibar Thin Liquid

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa antes de una radiografía u otra prueba similar.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo ha tenido alguno de los siguientes problemas de salud: obstrucción, perforación, hemorragia, lesiones, quemaduras o problemas de flujo de sangre en el tracto gastrointestinal (GI); tránsito lento en el tracto gastrointestinal (GI); o un problema llamado megacolon tóxico.
- Si su hijo tuvo recientemente un orificio en el tubo GI (gastrointestinal), una cirugía GI o radiación aplicada en el área pélvica.

### Todos los productos orales:

- Si su hijo presenta problemas para tragar o ha inhalado alimento, líquidos, saliva o vómito hacia los pulmones.
- Si su hijo tiene un orificio entre el esófago y la tráquea (los conductos para tragar y respirar).

### **Líquido (suspensión):**

- Si el cuerpo del niño no puede descomponer la fructosa.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Este medicamento evita la absorción de otros medicamentos. Si el niño toma otros medicamentos, consulte al médico para saber si debe dárselos en un momento distinto al que toma este medicamento.
- Para prevenir el estreñimiento o una obstrucción intestinal provocada por este medicamento, es posible que su médico le indique a su hijo utilizar un laxante como la leche de magnesia o la lactulosa luego de utilizar este medicamento. Siga las instrucciones del médico.
- Procure que su hijo ingiera mucha cantidad de líquidos sin cafeína, a menos que el médico le indique lo contrario.

- En raras ocasiones, este fármaco puede filtrarse a los vasos sanguíneos desde el tracto gastrointestinal. Los efectos secundarios incluyen coágulos y presión arterial muy baja. En ocasiones, esto puede ser mortal. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

### **Cápsulas:**

- Deberá evitar administrar laxantes, enemas o supositorios a su hijo durante algún tiempo antes de que comience con este medicamento. Siga las instrucciones del médico.

### **Líquido (suspensión):**

- Algunos productos contienen sorbitol en su composición. Han ocurrido problemas de salud muy graves, como niveles bajos de azúcar en la sangre, hemorragia e insuficiencia renal, si personas que no pueden descomponer la fructosa toman un producto que contiene sorbitol. Consulte con el médico.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica, tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, ampollada o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual, o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la

garganta. En muy pocas ocasiones, algunas reacciones alérgicas han causado una amenaza para la vida.

- Estreñimiento severo o dolor estomacal. Estos pueden ser signos de un problema intestinal grave.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Todos los productos orales:

- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Cólicos abdominales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## ¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### Tabletas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.

### Cápsulas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Si su hijo no puede tragar este medicamento entero, puede disolver el

contenido en puré de manzana. Si lo hace, el niño debe tragar la mezcla inmediatamente. No almacene la mezcla para usar más adelante.

## **Líquido (suspensión):**

- Agite bien antes de usar.
- La mayoría de las veces, este medicamento se toma por vía oral. Adminístrelo según las indicaciones del médico.
- Algunas marcas de este medicamento deben tomarse con alimentos. Algunas marcas pueden tomarse con o sin alimentos. Pregúntele al farmacéutico si debe administrar con alimentos el medicamento de la marca que toma su hijo.
- Algunos productos pueden administrarse en forma de enema. Si su hijo utiliza este medicamento como enema, deberá colocarse en el recto según las indicaciones de su médico.

## **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- La mayoría de las veces, este medicamento se administra en el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le proporcione su médico.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

# Última fecha de revisión

2025-08-26

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Barium - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center