

## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Benzocaine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Allevacaine [OTC]; Anacaine [DSC]; Anbesol Cold Sore Therapy [OTC]; Anbesol Maximum Strength [OTC]; Baby Anbesol [OTC]; CankerMelts [OTC]; Cepacol INSTAMAX [OTC] [DSC]; GoodSense Oral Pain Relief [OTC]; HurriCaine One [OTC]; Hurracaine [OTC]; Hurricane Snap-n-Go [OTC] [DSC]; HurriPak Starter Kit [OTC] [DSC]; Instant Oral Pain Relief Max [OTC]; Ivy-Rid [OTC]; LolliCaine [OTC]; Medicaine/Sting & Bite Ampules [OTC]; Mucinex InstaSoothe Sore Thrt [OTC]; Ora-film [OTC]; Zilactin Baby [OTC]

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

#### **Todos los productos para la piel:**

- Se utiliza para aliviar la comezón y el dolor de picaduras de insectos o irritación en la piel.

- Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor que causan las quemaduras de sol y la irritación de la piel.

### **Todos los productos orales:**

- Este medicamento se utiliza para tratar úlceras en la boca.
- Este medicamento se utiliza para tratar las úlceras aftosas.
- Este medicamento se utiliza para tratar la irritación de la boca.
- Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor en la boca y la garganta.

### **Para uso rectal:**

- Este medicamento se utiliza para tratar los síntomas de las hemorroides o la irritación rectal.

**¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si hay una infección en la zona en donde se usará este medicamento.

### **Todos los productos orales:**

- Si el paciente es un niño menor de 2 años. No administre este medicamento a niños menores de 2 años de edad. No use este medicamento para la dentición.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

#### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del

niño.

- Medicamentos como este han causado un problema grave en la sangre denominado metahemoglobinemia. El riesgo puede aumentar en personas que tienen deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), problemas cardíacos o problemas pulmonares. El riesgo también puede ser mayor en personas que toman determinados medicamentos y en bebés menores de 6 meses. Informe al médico si su hijo alguna vez ha tenido metahemoglobinemia.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este medicamento a un niño.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

### **Todos los productos orales:**

- No permita que el niño coma mientras tiene adormecida la boca. Puede lastimarse al morderse la lengua.

### **Pastilla:**

- Si su hijo tiene un nivel alto de azúcar en sangre (diabetes), controle las etiquetas cuidadosamente. Algunos productos contienen azúcar.

### **Pulverizador oral:**

- No inhale este medicamento. Inhalarlo podría ocasionar daños o la muerte.

### **Todos los productos rectales y los productos para la piel:**

- Proteja la ropa y las telas de las manchas.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.

### **Pulverizador cutáneo:**

- No inhale este medicamento. Inhalarlo podría ocasionar daños o la muerte.

**¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

### **Todas las presentaciones:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de metahemoglobinemia, como coloración azul o gris de los labios, las uñas o la piel; latido cardíaco que no parece normal; convulsiones; mareos muy intensos o desmayos; dolor de cabeza muy intenso; mucha somnolencia; cansancio o debilidad; o falta de aire. Este efecto es poco frecuente pero puede ser mortal si se produce.

### **Para uso rectal:**

- Si el niño tiene grave hemorragia rectal o siente dolor en el recto.

### **Todos los productos orales:**

- Dolor grave en la boca.
- Cuando esté tratando un dolor de garganta grave, si los síntomas duran más de 2 días o bien, si los mismos

ocurren con fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náusea o vómitos.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

#### **Todas las presentaciones:**

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

#### **Todos los productos orales:**

- Hormigueo en la boca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del

médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todos los productos para la piel:**

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.
- Este medicamento puede incendiarse. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.
- Tenga cuidado al colocar en una área extensa de la piel o donde tenga heridas abiertas. Consulte al médico.
- No cubra el área (con vendas, apósitos) a menos que se lo indique el médico.

### **Pulverizador cutáneo:**

- Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este producto antes de usarlo.

### **Todos los productos orales:**

- No permita que su hijo coma ni beba durante al menos 1 hora después tomar este medicamento.

### **Crema, gel, líquido y ungüento:**

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Aplique una capa fina sobre la zona afectada.
- Manténgalo alejado de los ojos de su hijo.

### **Suspensión oral:**

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- Dígale al niño que mueva el medicamento de lado a lado en la boca y luego que lo escupa.
- No permita que el niño trague el medicamento.
- Manténgalo alejado de los ojos de su hijo.

### **Pastilla:**

- El niño debe chupar la pastilla oral. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla. Recuérdele al niño que no la trague entera.

### **Pulverizador oral:**

- Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este producto antes de usarlo.
- Este medicamento puede incendiarse. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.

### **Tableta de disolución oral:**

- Colóquela sobre la lengua de su hijo y deje que se disuelva. No se necesita agua. No deje que su hijo la trague entera. No deje que su hijo la mastique, rompa ni triture.

### ***Tira oral:***

- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- Asegúrese de que el niño la deje disolver en la boca. No se necesita agua.

### **Para uso rectal:**

- Este medicamento es únicamente para uso rectal. No administre este medicamento por la boca.
- No se coloque este medicamento en el recto con los dedos ni con ningún tipo de aplicador. Siga las instrucciones del médico.

**¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Si el niño usa este medicamento con regularidad, dele la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre a su hijo con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Todos los productos para la piel:**

- Proteja del calor o del fuego.

## **Pulverizador cutáneo:**

- No perforo ni quemé el producto, incluso si parece vacío.

## **Todos los productos orales:**

- Proteja del calor.

## **Suspensión oral:**

- Puede refrigerarlo para que tenga mejor sabor.
- Deseche la porción del medicamento que no haya consumido 2 semanas después de que el medicamento se mezcló.

## **Pulverizador oral:**

- Proteja del calor y de llama abierta. No perforo ni quemé el producto, incluso si parece vacío.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y

opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2023-12-04

## **Derechos de autor**

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Benzocaine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center