

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Budesonide and Formoterol

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Breyna; Symbicort

Nombres comerciales: Canadá

Symbicort 100 Turbuhaler; Symbicort 200 Turbuhaler; Symbicort Forte Turbuhaler

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el asma.
- No administre este medicamento para tratar un ataque de asma. Utilice un inhalador de rescate. Hable con el médico.
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este

medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño usa otro medicamento como este. Si no está seguro, consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este

medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si el niño tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.
- Pueden necesitarse hasta 2 semanas para que se manifiesten los resultados completos.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene problemas respiratorios que empeoran, si el inhalador de emergencia no funciona tampoco o si su hijo necesita el inhalador de emergencia con más frecuencia.
- No administre más cantidad de este medicamento ni procure que su hijo lo utilice durante más tiempo del que se le indicó. Se han informado muertes debido a dosis excesivas de este tipo de medicamento. Consulte al médico de su hijo.
- Al cambiar de un esteroide oral a otra forma de esteroide, puede haber efectos secundarios graves y, a veces, mortales. Pueden aparecer signos como debilidad, cansancio, mareos, malestar estomacal, vómitos, confusión o niveles bajos de azúcar en sangre.

Llame al médico de inmediato si su hijo tiene cualquiera de estos signos. Si su hijo tiene una lesión grave, se somete a una cirugía o cualquier tipo de infección, es posible que necesite dosis adicionales de esteroides orales. Estos esteroides adicionales ayudarán a que el cuerpo de su hijo pueda lidiar con estas presiones. Su hijo deberá llevar una identificación de alerta médica.

- El uso a largo plazo puede aumentar la probabilidad de desarrollar cataratas, glaucoma o debilitación ósea (osteoporosis). Consulte con el médico de su hijo.
- Haga que el niño se someta a un examen de la vista según las indicaciones del médico.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- La varicela y la rubéola pueden ser muy graves, e incluso mortales, en personas que toman medicamentos con esteroides como este medicamento. Evite que su hijo esté cerca de personas con varicela o rubéola si no tuvo esos problemas de salud anteriormente. Si su hijo estuvo expuesto a la varicela o a la rubéola, consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que

necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos,

dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Síntomas de una glándula suprarrenal débil, como náuseas o vómitos muy fuertes, mareos fuertes o desmayos, debilidad muscular, sensación de cansancio, cambios de humor, disminución del apetito o pérdida de peso.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Temblores.
- Nerviosismo o excitabilidad.

- Dolor de huesos.
- Mareos o desmayos.
- Convulsiones.
- Malestar estomacal intenso o vómitos.
- Se siente muy cansado o débil.
- Problemas para dormir.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Dolor de los senos paranasales.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Enrojecimiento o manchas blancas en la boca o la garganta.
- Irritación bucal o úlceras bucales.
- Este medicamento puede provocar problemas respiratorios muy graves inmediatamente después de que su hijo tome una dosis. A veces, esto podría poner su vida en riesgo. Si su hijo tiene problemas respiratorios, respiración que empeora, sibilancia o tos después de usar este medicamento, él debe utilizar un inhalador de emergencia y usted buscar ayuda médica de inmediato.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Dolor de estómago.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Signos de un resfrío común.
- Dolor de espalda.
- Vómitos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del

médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Para inhalar (soplar) solamente.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Prepare el inhalador antes de usarlo por primera vez, si no lo ha usado durante más de 7 días o si se ha caído. Rocíe 2 pulverizaciones de prueba al aire. Agite bien durante 5 segundos antes de cada pulverización de prueba.
- Agite bien durante 5 segundos antes de cada uso.
- El niño debe enjuagarse la boca luego de cada uso. Recuérdele al niño que no trague el agua del enjuague. El niño debe escupirla.
- Vuelva a tapar después de administrarle la dosis al niño.
- Este inhalador tiene un contador de dosis para registrar las dosis restantes. Deseche el inhalador cuando se le indique después de abrirlo o cuando el contador de dosis llegue a cero, lo que suceda primero.
- Siga las instrucciones sobre cómo limpiar el inhalador según se le ha indicado.
- Nunca lave el inhalador. Manténgalo seco.

- Si su hijo toma más de 1 medicamento inhalado, pregúntele al pediatra cuál debe darle primero.
- Si este medicamento ingresa en los ojos del niño, lave con agua de inmediato. Si el niño tiene irritación en los ojos que perdura o cambios en la visión, llame al médico.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Guarde a temperatura ambiente. Tire cualquier porción sin usar 3 meses después de sacarla del paquete de aluminio.
- Proteja del calor y de llama abierta. No perforo ni quemé el producto, incluso si parece vacío.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Almacene con la boquilla hacia abajo.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan

expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la

medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-03-30

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Budesonide and Formoterol - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center