

## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Bupropion

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### Nombres comerciales: EE. UU.

Aplenzin; Forfivo XL; Wellbutrin SR; Wellbutrin XL

### Nombres comerciales: Canadá

MYLAN-BuPROPion XL [DSC]; ODAN Bupropion SR; TARO-Bupropion XL; TEVA-Bupropion XL; Wellbutrin SR [DSC]; Wellbutrin XL; Zyban

### Advertencia

- Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas o acciones suicidas en niños y adultos menores. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estos pensamientos o reacciones en el pasado. Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vigilancia cuidadosa. Llame al médico de inmediato si hay signos de depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico o cambios de humor o reacciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene algún pensamiento o reacción suicida.

### ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la depresión.
- Este medicamento se utiliza para prevenir el trastorno afectivo estacional (TAD).

- Se usa para ayudar a dejar de fumar.
- Si su hijo ha estado consumiendo este medicamento, consulte con el médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo alguna vez tuvo convulsiones.
- Si su hijo consume mucho alcohol y deja de beber en forma repentina.
- Si usa otros medicamentos o productos naturales determinados que intensifican sus acciones (como medicamentos para las convulsiones o la ansiedad) y deja de hacerlo repentinamente.
- Si su hijo ha tenido un problema alimenticio como anorexia o bulimia.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si su hijo tomó ciertos medicamentos para la depresión u otro tipo de enfermedad en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, o trancipromina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
- Si su hijo está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: Clopidogrel, linezolid, azul de metileno o ticlopidina.
- Si su hijo está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma

(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Controle la presión arterial de su hijo según le haya indicado el médico.
- Es posible que este medicamento aumente la posibilidad de tener convulsiones. El riesgo puede aumentar en personas que toman dosis mayores, tienen determinados problemas de salud o toman otros medicamentos. Las personas que repentinamente dejan de beber mucho alcohol o de repente dejan de tomar ciertas drogas (como las que se usan para la ansiedad, el sueño o las convulsiones) también pueden tener un

mayor riesgo. Hable con el médico para saber si su hijo tiene mayores posibilidades de tener convulsiones.

- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos completos.
- Este medicamento no está aprobado para utilizarse en niños. Hable con el médico.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

### **Si su hijo/hija fuma:**

- No todos los productos están aprobados para ayudarlo a dejar de fumar. Hable con el médico para asegurarse de que tiene el producto adecuado.
- Se presentaron problemas mentales, anímicos o de conducta nuevos o peores cuando se usó bupropion para dejar de fumar. Estos problemas incluyen pensamientos suicidas u homicidas, depresión, reacciones violentas, furia, ansiedad e ira. Estos problemas se presentaron en personas con o sin antecedentes de problemas mentales o anímicos. Consulte con el médico.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario

muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Sentirse confundido, no poder concentrarse o cambiar de comportamiento.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Si las convulsiones aparecen o empeoran al iniciar el medicamento.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Inflamación.
- Falta de aire.
- Cambios en la audición.
- Zumbido en los oídos.
- Orina con más frecuencia.
- Glándula inflamada.
- Dificultad para trasladarse.
- Algunas personas pueden tener mayores probabilidades de padecer problemas en los ojos con este medicamento. Es posible que el médico quiera realizarle al niño un examen de los ojos para ver si tiene una mayor probabilidad de padecer estos problemas. Llame al médico de inmediato si el niño tiene dolor en el ojo, cambios en la vista o hinchazón o enrojecimiento en o alrededor del ojo.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo

presenta signos como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Todas las presentaciones:

- Mareos o dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Temblores.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Sueños extraños o peculiares.
- Gases.
- Boca seca.
- Problemas para dormir.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Sudoración excesiva.
- Cambio inexplicado en el peso.

### Tabletas de liberación extendida:

- Para algunas marcas, es posible que usted o su hijo vean la cobertura de la tableta en las heces del niño. Para estas marcas, esto es normal y no es motivo de inquietud. Si tiene preguntas, consulte con el médico.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Para todos los usos de este medicamento:**

- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- No administre este medicamento con mayor frecuencia de la que le indicaron. Esto puede aumentar el riesgo de convulsiones. Asegúrese de saber con qué intervalos tiene que administrarle las dosis a su hijo.
- Si administra este medicamento una vez al día, adminístrelo por la mañana.
- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Si su hijo no puede dormir, no debe tomar este medicamento poco tiempo antes de irse a dormir. Hable con el médico.
- El niño debe tragar la tableta entera. Dígale que no la mastique, rompa ni triture.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.

### **Para dejar de fumar:**

- Su hijo puede tomar este medicamento durante 1 semana antes de dejar de fumar.
- Es posible que se utilice un reemplazante de la nicotina y asesoría al mismo tiempo para obtener mejores resultados.

- Si su hijo no logró dejar de fumar después de tomar este medicamento durante 12 semanas, hable con el médico.
- Es posible que su hijo tenga signos de abstinencia de nicotina cuando intente dejar de fumar incluso al usar medicamentos como este para dejar el hábito. Existen muchos signos de abstinencia de nicotina. En pocas ocasiones ha habido depresión e ideas suicidas en personas que intentan dejar de fumar. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico de su hijo.

## ¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2024-05-23

## Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Bupropion - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center