

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Clindamycin (Topical)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Cleocin; Cleocin-T; Clindacin; Clindacin ETZ; Clindacin Pac [DSC]; Clindacin-P; Clindagel; Clindesse; Evoclin [DSC]; Xaciat

Nombres comerciales: Canadá

Clinda-T [DSC]; Dalacin Vaginal; TARO-Clindamycin

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Todos los productos para la piel:

- Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

Todos los productos vaginales:

- Este medicamento se utiliza para tratar infecciones vaginales. Si se ha indicado este medicamento por

alguna otra razón, hable con su médico para obtener más información.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo presentó alguna vez algunos de los siguientes problemas de salud: Enfermedad de Crohn, otros problemas estomacales o intestinales (colitis, enteritis) o problemas intestinales graves mientras se toma un antibiótico (diarrea grave, hinchazón intestinal, dolor estomacal).
- Si su hijo está usando algún producto con eritromicina.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos

sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Todos los productos para la piel:

- No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el médico.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos

completos.

- Consulte con el médico de su hijo antes de usar otros medicamentos o productos en su piel. Esto incluye los jabones.
- Algunos de estos medicamentos pueden prenderse fuego. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.
- Si su hija amamanta un bebé y aplica este medicamento en los senos o pezones, haga que su hija lave el área antes de amamantar al bebé.

Todos los productos vaginales:

- No permita que la niña se realice duchas vaginales ni utilice otros productos vaginales como tampones mientras ella se administra este medicamento. Es posible que su hija deba evitar estas prácticas durante un tiempo después de su última dosis. Consulte con el pediatra de su hijo si tiene preguntas.
- No se lo administre a su hijo durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Es posible que haya una segunda infección.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Asegúrese de que su hija no tenga relaciones sexuales mientras toma este medicamento. Es posible que su hija

deba evitar mantener relaciones sexuales durante un tiempo después de su última dosis. Consulte con el pediatra de su hijo si tiene preguntas.

Gel vaginal:

- Es posible que los condones de poliuretano no sean eficaces para evitar el embarazo o detener la propagación de enfermedades de transmisión sexual mientras se use este medicamento y durante 7 días después suspender la administración de este medicamento. Su hijo necesitará usar condones de látex o poliisopreno durante ese tiempo.

Todos los otros productos vaginales :

- Es posible que los condones o los diafragmas no eviten el embarazo ni detengan la propagación de enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales mientras se consume este medicamento y durante un periodo después de que su hijo suspenda la administración de este medicamento. Su hija deberá utilizar algún otro método anticonceptivo durante un tiempo después de su última dosis. Asegúrese de saber cuánto tiempo su hija deberá hacer esto.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco

frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Con la mayoría de los antibióticos, se presentó un tipo de diarrea intensa denominada diarrea asociada con *Clostridium difficile* (C diff) (DACD). En ocasiones puede ser mortal. Esto puede ocurrir mientras está tomando el antibiótico o al cabo de unos meses de que su hijo lo haya suspendido. Llame a su médico de inmediato si su hijo tiene dolor de estómago o cólicos, heces muy blandas, acuosas o con sangre. No intente tratar la diarrea sin consultar primero con el médico.

Todos los productos vaginales:

- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Picazón o flujo vaginal.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todos los productos para la piel:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Ardor.
- Picazón.
- Piel seca.
- Enrojecimiento.
- Piel aceitosa.

Espuma:

- Dolor de cabeza.

Todos los productos vaginales:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Dolor de espalda.
- Estreñimiento.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos para la piel:

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico de su hijo u otro proveedor de atención médica,

aun si el niño se siente bien.

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.
- No aplique sobre heridas abiertas o piel lastimada.

Loción:

- Agite bien la loción antes de usarla.

Frotis:

- Si usa compresas, retírela del envoltorio inmediatamente antes de usarla. Utilícela una vez y deséchela. Se puede usar más de una compresa.

Espuma:

- Aplique la espuma sobre una superficie fresca o en la tapa. No coloque la espuma directamente en las manos.
- Si la lata está caliente o la espuma parece líquida, pásela por agua fría.

Todos los productos vaginales:

- No administre este medicamento por la boca. Solo para uso vaginal. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos del

niño (puede arder).

- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico de su hijo u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Lávese las manos antes y después de usar.

Crema vaginal:

- Algunos productos deben administrarse a la hora de acostarse. Para algunos productos, es lo mismo. Consulte con el farmacéutico sobre cómo administrar este medicamento.

Gel vaginal:

- No vuelva a utilizar los aplicadores.

Supositorio:

- Utilícelo a la hora de acostarse.
- Para usar un supositorio, retírelo del envase de aluminio.
- No usar si la bolsa que contiene este medicamento está rota, abierta o no está sellada en su totalidad.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Gel vaginal:

- Solamente se necesita 1 dosis de este medicamento. Si el niño omite una dosis, dásela tan pronto como lo

recuerde.

Todas las demás presentaciones:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Espuma:

- Protéjase del calor y de la luz solar. No perforo ni quemé el producto, incluso si parece vacío.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de

diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-02-16

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Clindamycin (Topical - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center