
EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Dabrafenib

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Tafinlar

Nombres comerciales: Canadá

Tafinlar

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar el cáncer.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamente a un bebé mientras tome este medicamento y durante 2 semanas después de la última dosis.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- En ocasiones, el dabrafenib se toma con el trametinib. Si su hijo está tomando dabrafenib con trametinib,

asegúrese de conocer los efectos secundarios que se pueden presentar con cada medicamento. Cuando estos medicamentos se toman juntos, puede aumentar la posibilidad de determinados efectos secundarios. Estos efectos secundarios pueden ser graves y, en ocasiones, mortales. Esto incluye hemorragias; hemorragias cerebrales; coágulos de sangre; problemas en la vista; fiebre; problemas cardíacos (como insuficiencia cardíaca); niveles altos de azúcar en sangre; otros tipos de cáncer y reacciones cutáneas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson. Consulte con el médico sobre la posibilidad de que surjan efectos secundarios con los medicamentos de su hijo.

- Controle los análisis de sangre y la función cardíaca de su hijo según le haya indicado el médico. Su hijo también tendrá que hacerse exámenes oculares.
- Tenga cuidado si su hijo presenta niveles bajos de una enzima llamada G6PD. Puede desarrollar anemia. Los niveles bajos de G6PD pueden ser más probables en pacientes de ascendencia africana, sudasiática, de Oriente Medio y mediterránea.
- Este medicamento puede hacer que su hijo tenga más predisposición a las quemaduras por exposición solar. Tenga cuidado si su hijo estará expuesto al sol. Informe al médico de su hijo si se quema fácilmente al exponerse

al sol mientras consume este medicamento.

- Este medicamento puede aumentar la probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer. Consulte al médico.
- Haga controlar la piel de su hijo. Informe al médico de su hijo si presenta cambios en la piel como una verruga nueva, llagas o un bulto rojizo que sangra o que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.
- Si el niño tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.
- Controle la glucemia de su hijo según las indicaciones del médico.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad. Los problemas de fertilidad pueden derivar en incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre de un niño. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico antes que su hijo tome este medicamento.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Haga que su hija use un método anticonceptivo que no sea hormonal, como condones, para prevenir el embarazo mientras toma este medicamento y al menos durante 2 semanas después de dejar de tomarlo. Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia para prevenir el embarazo. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si la pareja sexual de su hijo está o puede quedar embarazada, debe usar condones mientras su hijo tome este medicamento y por 2 semanas después de la última dosis. Deben usar un condón incluso si su hijo se sometió a una vasectomía. Si la pareja de su hijo está o queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de hemorragia como vomitar o toser sangre, vómito que parece café molido, sangre en la orina, heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado de las encías, sangrado vaginal anormal, moretones sin causa o que se agrandan, o sangrado que no puede detener.
- Síntomas de problemas con los líquidos y electrolitos, como cambios de humor, confusión, dolor o debilidad en los músculos, latidos cardíacos anormales, mareos graves o desmayos, aumento de la sed, convulsiones, mucho cansancio o debilidad, disminución del apetito, incapacidad para orinar o cambio en la cantidad de orina producida, boca seca, ojos secos o malestar estomacal grave o vómitos.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Fiebre o escalofríos.
- Orina oscura o piel/ojos amarillentos.
- Dolor de ojos.
- Enrojecimiento o irritación en las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Dolor o presión en el pecho.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Este medicamento ha provocado problemas oculares graves. En ocasiones, ha provocado la pérdida de la visión. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta visión borrosa, pérdida de la visión u otros cambios en la visión. Llame al médico de inmediato si su hijo ve puntos

o halos de color, o si las luces brillantes le molestan a su hijo.

- Este medicamento puede causar insuficiencia cardíaca. Deberá controlarse la función cardíaca de su hijo mientras tome este medicamento. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas de problemas del corazón, como tos o falta de aire que sean nuevos o que hayan empeorado, hinchazón de los tobillos o las piernas, latidos cardíacos anormales, aumento de peso de más de 2,25 kg (5 lb) en 24 horas, mareos o desmayos.
- Es común presentar reacciones cutáneas cuando toma este medicamento. Sin embargo, también pueden producirse reacciones cutáneas graves. Esto incluye el síndrome de Stevens-Johnson (SJS). A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.
- Con este medicamento se ha producido un problema del sistema inmunitario denominado linfohistiocitosis

hemofagocítica primaria (HLH). Llame al médico de inmediato si su hijo tiene fiebre, glándulas inflamadas, sarpullido, hinchazón en el área del estómago o dolor estomacal agudo.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Pérdida del pelo.
- Cambios en la piel. Endurecimiento y engrosamiento.
- Acné.
- Piel seca.
- Dolor de cabeza.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de espalda, muscular o articular.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Tos.
- Irritación en la nariz o garganta.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Administre este medicamento en ayunas. Adminístrello al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- Consulte al médico sobre hacer que su hijo tome mucho líquido y otras formas de evitar la pérdida de líquidos. Si su hijo tiene una gran pérdida de líquidos, puede presentar más efectos secundarios con este medicamento.
- No repita la dosis si su hijo o hija vomita luego de tomarla. Administre la siguiente dosis a su hijo o hija en

el horario habitual.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Cápsulas:

- Procure que su hijo trague el medicamento entero. No deje que el niño la mastique, abra, rompa ni triture.

Tabletas para suspensión:

- Si el paciente es un niño pequeño que no puede pasar tiempo sin comer, se le puede dar leche materna o de fórmula según sea necesario.
- No permita que su hijo o hija trague el medicamento entero, ni tampoco que lo mastique o lo triture.
- Antes de administrar, asegúrese de saber cómo mezclar y medir la dosis de este medicamento. Consulte al médico o el farmacéutico si no está seguro.
- Para mezclar este medicamento, ponga en un vaso el número de tabletas necesarias para una dosis. Agregue 5 ml de agua si la dosis es de 1 a 4 tabletas. Agregue 10 ml de agua si la dosis es de 5 a 15 tabletas. Remueva suavemente con el mango de una cucharita hasta que las tabletas estén completamente mezcladas. Puede tardar al menos 3 minutos.

- El medicamento mezclado será de color blanco turbio.
- Administre la dosis a su hijo/a dentro de los 30 minutos después de la mezcla. Deseche la porción que no utilice luego de 30 minutos de la mezcla.
- Después de administrarle este medicamento a su hijo o hija, agregue 5 ml de agua al vaso vacío y remueva con el mango de una cuchara para aflojar cualquier resto de medicamento que haya quedado en el vaso. Pídale a su hijo o hija que lo beba para asegurarse de tomar toda la dosis.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si faltan menos de 6 horas para la dosis siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Tabletas para suspensión:

- Si este medicamento viene en una botella, mantenga la tapa bien cerrada. Cada botella tiene 2 desecantes (protegen el medicamento de la humedad). Guárdelos en la botella. No deje que su hijo coma los desecantes.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto

informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener

información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión
2025-05-21

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Dabrafenib - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center