

Delandistrogene Moxeparvovec

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Elevidys

Advertencia

- Este medicamento provocó problemas hepáticos graves. Algunos de estos pusieron en peligro la vida o fueron mortales. El riesgo de problemas hepáticos puede ser mayor si su hijo ya tiene problemas hepáticos. La mayoría de las veces, esto sucedió dentro de las 8 semanas posteriores a la dosis. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene cualquier signo de problemas hepáticos.
- Su hijo deberá someterse a pruebas hepáticas antes de recibir este medicamento y semanalmente durante al menos 3 meses después de recibir la dosis.
- Su hijo deberá permanecer cerca de un centro médico adecuado durante al menos 2 meses después de recibir este medicamento. Consulte al médico de su hijo.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se administra para tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD).

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene una infección, o si ha tenido una en las últimas 4 semanas.
- Si vacunaron a su hijo en las últimas 4 semanas.
- Si su hijo tiene enfermedad hepática.
- Si su hijo se ha sometido a pruebas y sabe que su hijo tiene una deleción en el exón 8 o el exón 9 en el gen DMD.
- Si su hijo se ha sometido a las pruebas y usted sabe que tiene anticuerpos anti-AAV.
- Si su hija está o podría estar embarazada. Este medicamento no se usa durante el embarazo.
- Si su hija está amamantando a un bebé o planea hacerlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes del comienzo del tratamiento con este medicamento. Hable con el médico de su hijo para saber cuándo necesita recibir alguna vacuna antes de comenzar a tomar este medicamento.
- Se administrará un medicamento esteroide como la prednisona antes y después de este medicamento para ayudar a evitar los efectos secundarios. Informe al médico si el medicamento esteroide no se usa como se le indicó.
- Este medicamento tomado con un esteroide puede aumentar el riesgo de que una infección se agrave. Algunas infecciones han sido mortales. Haga que su hijo se lave las manos con frecuencia. Mantenga a su hijo lejos de personas que estén resfriadas, engripadas o que tengan infecciones. Informe al médico si su hijo presenta signos de infección antes de empezar a tomar este medicamento o después de tomarlo. Algunos signos de infección pueden ser fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos, sibilancias, estornudos o secreción nasal.
- Después de recibir este medicamento, la orina y las heces pueden contener este medicamento. Deberá tener especial cuidado durante 1 mes después de que su hijo reciba este medicamento. Lávese bien las manos. Coloque todo lo que pueda tener orina o las heces de su hijo en una bolsa sellada y tírelo a la basura doméstica. Si tiene alguna pregunta, hable con el médico de su hijo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel

enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Confusión u otros cambios mentales.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Los problemas musculares se han producido aproximadamente 1 mes después de la infusión. En algunos casos, estos han sido graves o potencialmente mortales. Informe de inmediato al médico si su hijo presenta cualquier aumento inexplicable de sensibilidad, debilidad o dolor muscular. Esto incluye dificultad para tragar, falta de aire o dificultad para hablar.
- Se han observado problemas cardíacos graves entre 24 horas y más de 1 año después de la infusión. Algunas de estas han puesto en riesgo la vida. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene dolor de pecho, falta de aire o inflamación.
- Pueden ocurrir reacciones a la infusión con este medicamento. Su hijo será vigilado mientras recibe este medicamento y durante 3 horas después de la infusión para observar si hay reacciones. Informe inmediatamente al médico si su hijo tiene latidos cardíacos rápidos, respiración acelerada, dificultad para respirar o aleteo nasal. Informe inmediatamente al médico si su hijo presenta hinchazón o picazón en los labios, erupción cutánea o urticaria, fiebre, escalofríos, sofocos, malestar estomacal o vómitos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Fiebre leve.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el

retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-11-24

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Delandistrogene Moxeparvovec - Last updated on July 2, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Julio 2, 2023

Learn about our [Health Information Policy](#).



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center