

Denosumab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Aukelso; Bildyos; Bilprevda; Bomynta; Bosaya; Conexxence; Enoby; Jubbonti; Jubereq; Osenvelt; Ospomyv; Osvyrti; Prolia; Stoboclo; Wyost; Xgeva; Xtrenbo

Nombres comerciales: Canadá

Bildyos; Jubbonti; Osenvelt; Prolia; Stoboclo; Tuzemty; Wyost; Xgeva

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Xgeva, Aukelso, Bilprevda, Bomynta, Jubereq, Osenvelt, Oziltus, Wyost, Xbryk y Xtrenbo:

- Este medicamento se utiliza en el tratamiento de una variedad de cánceres.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

Prolia, Bildyos, Boncresa, Bosaya, Conexxence, Enoby, Jubbonti, Ospomyv, Osvyrti, Ponlimsi y Stoboclo:

- Este medicamento no está aprobado para su uso en niños. Se ha informado de niveles elevados de calcio en algunos niños, que a veces han tenido que ser tratados en el hospital. El crecimiento de los huesos y los dientes también puede verse afectado. Consulte con el médico.
- Si el niño ha estado recibiendo esta forma de este medicamento, consulte al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este

medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene niveles bajos de calcio.
- Si su hijo está utilizando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Deberá consultar al médico de su hijo para saber si este medicamento es adecuado para su hijo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de fracturas en las piernas. Consulte al médico.

- La posibilidad de que se fracture un hueso aumenta si se interrumpe, omite o retrasa el tratamiento con este medicamento. Esto incluye los huesos de la columna. El riesgo de fracturarse más de 1 hueso en la columna aumenta si su hijo ya ha tenido un hueso fracturado en la columna. Asegúrese de que su hijo no interrumpa, omita ni retrase el tratamiento con este medicamento sin hablar con el médico de su hijo.
- Solicite que le hagan análisis de sangre y de densidad ósea a su niño según se lo haya indicado el médico.
- Administre calcio y vitamina D según las recomendaciones de su médico.
- Asegúrese de que su hijo se realice un examen odontológico antes de comenzar a recibir este medicamento.
- Cuide los dientes del niño. Visite regularmente al dentista.
- Se observaron niveles muy bajos de calcio en sangre con la administración de este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Se produjeron niveles altos de calcio luego de dejar de tomar este medicamento en personas con huesos en desarrollo y personas con tumor de células gigantes de hueso. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene signos de niveles altos de calcio, como debilidad, confusión, cansancio, dolor de cabeza, dolor estomacal o vómitos, estreñimiento o dolor de huesos.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 5 meses después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de niveles bajos de calcio como calambres o espasmos musculares, adormecimiento u hormigueo, o convulsiones.
- Signos de niveles de fosfato bajos como cambio en la visión, sensación de confusión, cambios de humor, dolor o debilidad muscular, falta de aire u otros problemas para respirar o tragar.
- Confusión.
- Lesiones en la boca.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Algún dolor nuevo o extraño en la ingle, la cadera o los muslos.
- Dolor de espalda, de articulaciones o de huesos muy intenso.
- Falta de aire.
- Mareos o desmayos graves.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Este medicamento puede provocar problemas en el maxilar. El riesgo puede ser mayor con el uso prolongado, si tiene cáncer, problemas dentales, dentadura postiza que no se ajusta bien, anemia, problemas con la coagulación de la sangre o una infección. También puede ser mayor si su hijo

recibe atención odontológica, quimioterapia, radiación, o si está tomando otros medicamentos que pueden causar problemas en la mandíbula. Muchos medicamentos pueden hacer esto. Consulte con el médico de su hijo si alguno de estos casos es pertinente para su hijo, o si tiene alguna pregunta. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene dolor o hinchazón en la mandíbula.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si su hijo padece efectos secundarios molestos o que no desaparecen.

- Dolor de espalda, muscular o articular.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Signos de un resfrío común.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor dental.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección subcutánea.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si necesita guardar este medicamento en casa, consulte la caja o el folleto que viene en la caja para ver cómo guardarlo. Si tiene preguntas sobre cómo guardar este medicamento, hable con el farmacéutico.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-04-27

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Denosumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center