
EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Dihydroergotamine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Brekiya; D.H.E. 45 [DSC]; Migranal [DSC]; Trudhesa

Nombres comerciales: Canadá

DHE; Migranal

Advertencia

- Se ha informado un flujo de sangre bajo en las manos, pies o cerebro cuando este medicamento se tomó con otros medicamentos como claritromicina, eritromicina, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nelfinavir, ritonavir y troleandomicina. Esto puede ser muy severo o mortal. No administre este medicamento a su hijo si está tomando alguno de estos otros medicamentos. Existen muchos medicamentos que pueden causar esto. Consulte para confirmar que puede administrar este medicamento a su hijo de manera segura con todos los demás medicamentos que toma.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la jaqueca.
- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño tiene alguno de estos problemas de salud: presión alta o algún tipo de dolores de cabeza por migraña, como migraña hemipléjica o basilar.
- Si su hijo tiene alguno de estos problemas de salud: problemas en los vasos sanguíneos; dolor u opresión en el pecho; enfermedad cardíaca, renal o hepática; flujo sanguíneo bajo; infección muy grave o una cirugía reciente en los vasos sanguíneos.
- Si su hijo ha tenido un ataque cardíaco.
- Si su hijo ha tomado almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán o zolmitriptán durante las últimas 24 horas.
- Si el niño ha tomado ergotamina, metisergida u otro medicamento similar durante las últimas 24 horas.

Si su hija está embarazada:

- No administre este medicamento a su hija durante el

embarazo.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 3 días después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este

medicamento. Controle la presión arterial de su hijo según le haya indicado el médico.

- Su hijo puede necesitar una prueba de la función cardíaca antes de empezar a tomar este medicamento. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Tenga cuidado si su hijo tiene riesgos de enfermedad cardíaca (hipertensión, colesterol alto, sobrepeso, azúcar alta en sangre, diabetes, tabaquismo u otro consumo de nicotina, o tiene miembros de la familia con enfermedad cardíaca temprana). Consulte con el médico.
- Si su hijo bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronja (pomelo) con frecuencia, consulte al médico del niño.
- Este medicamento no es apto para el uso regular y diario. Consulte con el médico.
- Este medicamento no se indica para evitar o disminuir la cantidad de dolores de cabeza por migraña de su hijo/a. Consulte con el médico.
- No administre más cantidad de la que le indicó el médico. No administre este medicamento durante más tiempo del que se le indicó. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios severos.
- Administrar más cantidad de medicamento (una dosis

mayor, o más a menudo) de lo que le indicó el médico puede hacer que los dolores de cabeza empeoren.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Cambio en el color de las manos, los pies o de otras áreas. La piel se puede volver pálida, azul, gris, púrpura o roja.
- Entumecimiento, dolor, hormigueo o sensación de frío

en las manos o los pies.

- Llagas o heridas en los dedos de las manos o los pies.
- Dolor muscular o debilidad.
- Calambres o dolor en las piernas o la cadera.
- Sensación de pesadez o rigidez en los músculos de las piernas.
- Ardor o dolor persistente en los pies o los dedos de los pies.
- Inflamación.
- Diarrea o estreñimiento.
- Dolor estomacal intenso o diarrea con sangre.
- Dolor estomacal luego de comer.
- Fiebre.
- Pérdida de peso.
- Se han presentado problemas del corazón graves y, en ocasiones, mortales, como ataque cardíaco y latidos cardíacos anormales con la administración de este medicamento. Llame al médico de inmediato si su niño tiene rigidez, dolor, presión o pesadez en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula; dolor anormal en el brazo, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago; falta de aire; sudores fríos; malestar estomacal grave o vómitos; o si se siente mareado o se desmaya.

- En raras ocasiones, se informaron problemas graves, y en ocasiones mortales, en los vasos sanguíneos del cerebro, como accidentes cerebrovasculares, debido a la ingesta de este medicamento. Llame al médico del niño de inmediato si el niño tiene debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en 1 lado de la cara o cambios en la visión.
- Rara vez se han presentado problemas en las válvulas del corazón con la administración de este medicamento. Llame al pediatra de inmediato si su hijo presenta latidos cardíacos rápidos o anormales, falta de aire, hinchazón en los brazos o las piernas, o gran aumento de peso.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Pulverizador nasal:

- Náusea o vómito.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.

- Hemorragia nasal.
- Goteo o congestión nasal.
- Ardor.
- Nariz seca.
- Somnolencia.

Polvo nasal:

- Náusea o vómito.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Hemorragia nasal.
- Goteo o congestión nasal.
- Tos.
- Estornudos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intravenosa.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Administre este medicamento lo antes posible luego de haberse iniciado el ataque.
- Este producto debe ensamblarse antes de su uso. Una vez que se abre el vial y se prepara el aerosol nasal, utilícelo dentro de las 8 horas siguientes. Si no se utiliza dentro de las 8 horas, deseche el aerosol preparado.
- Antes del primer uso, prepare la bomba rociando 4 veces. Después de prepararla, asegúrese de saber cuánto dura el producto. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- No deje que su hijo incline la cabeza hacia atrás ni inhale por la nariz mientras esté rociando este medicamento ni inmediatamente después de usarlo.

Polvo nasal:

- Solo para nariz.
- Asegúrese de saber cómo utilizar este medicamento. Lea las instrucciones que vienen con este medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Administre este medicamento lo antes posible luego de haberse iniciado el ataque.
- No lo pruebe ni lo prepare antes de administrarlo.
- Retire la lengüeta azul redonda de la boquilla azul. Coloque la boquilla azul en una fosa nasal. Apriete la bomba de aire blanca 3 veces. Apriete rápido y por completo. No apriete despacio, lentamente, parcialmente ni con vacilación. Deje que la bomba de aire blanca recupere su forma original entre un apretón y otro.
- No administre más de 2 dosis en un lapso de 24 horas.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Este medicamento se administra según sea necesario. No administre al niño con mayor frecuencia que la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Pulverizador nasal:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Proteja del calor y de la luz.

Polvo nasal:

- Conserve a temperatura ambiente.
- No retire este medicamento de la bolsa hasta que su hijo esté listo para utilizarlo.

Inyección:

- La mayoría de las veces, este medicamento se administra en el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le proporcione su médico.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los

medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-05-30

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Dihydroergotamine - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center