

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Dupilumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Dupixent

Nombres comerciales: Canadá

Dupixent

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el eccema.
- Este medicamento se utiliza para tratar el asma.
- Se utiliza para tratar la esofagitis eosinofílica.
- Se indica para tratar problemas de los senos nasales a largo plazo con pólipos nasales.
- Este medicamento se utiliza para tratar la urticaria.
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los

riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

Para el asma:

- No administre este medicamento para tratar un ataque de asma. Utilice un inhalador de rescate. Hable con el médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si a su hijo/a le administraron una vacuna viva recientemente.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos

sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si es posible, asegúrese de que todas las vacunas estén actualizadas antes del tratamiento con este medicamento.
- Consulte con el médico antes de que su hijo reciba vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones muy graves o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- Si su hijo cambia a este medicamento luego de usar algún esteroide, no deje de darle el esteroide en forma repentina. Es posible que la dosis del esteroide deba reducirse poco a poco para evitar efectos secundarios. Consulte con el médico.

- Si su hijo es asmático, no cambie ni suspenda sus medicamentos para el asma sin consultarle al médico de su hijo.
- Algunas personas que tienen riesgo alto de infecciones por parásitos han contraído una infección por parásitos después de tomar este medicamento. El médico puede hacer un análisis de la materia fecal de su hijo para ver si tiene una infección por parásitos. Consulte con el médico.
- Use este medicamento con precaución en los niños. Pueden provocarles más efectos secundarios. Consulte al médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Si su hijo tomó este medicamento durante el embarazo, informe al médico del bebé.

Para el asma:

- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene problemas respiratorios que empeoran, si el inhalador de emergencia no funciona tampoco o si su hijo necesita el

inhalador de emergencia con más frecuencia.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de infecciones por herpes como herpes labial, herpes zóster, llagas en los genitales, dolor de cabeza intenso, confusión, cambio en la visión, enrojecimiento o dolor de los ojos.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de

orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.

- Latido cardíaco acelerado.
- Glándula inflamada.
- Mareos o desmayos.
- Náusea o vómito.
- Signos de problemas oculares nuevos o que empeoran, como cambios en la vista o dolor ocular.
- Erupción o enrojecimiento de la cara.
- Psoriasis nueva o que empeora.
- Este medicamento ha producido dolor articular, incluidos problemas para caminar. Algunas personas tuvieron que tratarse en un hospital. Informe al médico si su hijo ha manifestado un nuevo dolor articular o ha empeorado el que tenía mientras tomaba este medicamento.

Para el asma:

- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.
- Dolor de pecho.

- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Fiebre que no desaparece.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor, enrojecimiento, hinchazón u otra reacción en el lugar donde se administró la inyección.
- Irritación de ojos o párpados.
- Ojos secos.
- Dolor de garganta.
- Úlceras en la boca.
- Signos de un resfrío común.
- Problemas para dormir.
- Dolor dental.
- Dolor estomacal o cólicos.

- Diarrea.
- Dolor muscular.
- Dolor de espalda.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera

le indicarán cómo aplicar la inyección.

- Lávese las manos antes de usar.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Si su dosis es más de 1 inyección, aplíquelas en 2 lugares distintos.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo. Si tiene la jeringa de 100 mg, la jeringa de 200 mg o el cartucho de 200 mg, déjelos afuera durante 30 minutos. Si tiene la jeringa o el cartucho de 300 mg, déjelos afuera durante 45 minutos. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro sobre cuánto tiempo debe dejar este medicamento a temperatura ambiente antes de usarlo. No caliente este medicamento.
- No agitar.
- Manténgase alejado de la luz solar directa.
- Si se le cae la jeringa sobre una superficie dura o si está dañada, no la utilice.
- No lo aplique en la piel sensible, magullada, con

hematomas o cicatrices.

- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- No inyecte a través de la ropa.
- Cada pluma y jeringa precargada sirve para un único uso. Deseche cualquier la pluma o jeringa que haya usado luego de aplicar la dosis.
- Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Administración de dosis semanal única:

- Administre la dosis olvidada tan pronto como se acuerde y comience un nuevo horario basado en el momento de la administración de la dosis.

Si su hijo toma este medicamento cada 2 semanas:

- Administre la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde y retome el horario habitual de toma de su hijo.
- Si han transcurrido más de 7 días desde la dosis olvidada, administre la dosis faltante y comience un calendario nuevo a partir del momento en que se administra la dosis.

Si su hijo toma este medicamento cada mes:

- Administre la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde y retome el horario habitual de toma de su hijo.
- Si han transcurrido más de 7 días desde la dosis olvidada, administre la dosis faltante y comience un calendario nuevo a partir del momento en que se administra la dosis.

Para todos los usos de este medicamento:

- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si omite darle una dosis a su hijo, llame al médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si es necesario, puede guardarlo a temperatura ambiente hasta 25 °C (77 °F) por hasta 14 días. Escriba la fecha en que retiró este medicamento del refrigerador. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 14 días, deseche el medicamento.
- Proteja del calor y de la luz solar.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto

informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener

información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-07-09

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Dupilumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center