

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Eculizumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Bkemv; Epysqli; Soliris

Nombres comerciales: Canadá

Soliris

Advertencia

- Este medicamento aumenta el riesgo de infecciones meningocócicas graves. Se han presentado infecciones meningocócicas potencialmente mortales y mortales en personas tratadas con este tipo de medicamento. Estas infecciones pueden tornarse potencialmente mortales o pueden ser mortales muy rápido si no se tratan a tiempo. Se deberá administrar a su hijo una vacuna contra el meningococo como mínimo 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, a menos que el médico indique lo contrario. Si su hijo ha recibido una vacuna antimeningocócica anteriormente, es posible que deba recibir otra. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Las vacunas antimeningocócicas reducen el riesgo de infecciones meningocócicas, pero no impiden que se produzcan todas las infecciones de este tipo. Llame inmediatamente al médico de su hijo si presenta signos de una infección meningocócica, como dolor de cabeza con malestar estomacal o vómitos, fiebre o rigidez de cuello o espalda, confusión, fiebre con o sin erupciones cutáneas o taquicardia, dolores corporales con signos gripales, o si le molesta la luz en los ojos.
- Si su hijo no puede recibir una vacuna antimeningocócica como mínimo 2 semanas antes de comenzar a tomar este medicamento, debe tomar antibióticos como el médico lo indique.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar una enfermedad de la sangre y el riñón denominada síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa).
- Este medicamento se utiliza para tratar la miastenia gravis.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo

tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño no ha recibido una vacuna meningocócica.
- Si el niño tiene una infección meningocócica.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento podría aumentar el riesgo de infecciones graves. Esto incluye infecciones causadas por *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Haemophilus influenzae*. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas de estas infecciones. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes de

comienzo del tratamiento con este medicamento.

- Tenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente de su hijo en todo momento y durante 3 meses después de la suspensión del medicamento.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Signos de infecciones por herpes como herpes labial, herpes zóster, llagas en los genitales, dolor de cabeza intenso, confusión, cambio en la visión,

enrojecimiento o dolor de los ojos.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Latido cardíaco acelerado.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Se han producido reacciones a la infusión durante la infusión. Informe inmediatamente al médico de su hijo si su hijo tiene dolor en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, lengua o garganta, mareos intensos o desmayos, o cualquier otro efecto adverso durante la infusión o en el plazo de 1 hora después de la misma.
- Algunos problemas de salud pueden tener lugar después de suspender el uso de este medicamento. Su hijo deberá ser observado de cerca durante varias semanas luego de suspender este medicamento. Acuda a evaluación médica tal como le indicaron. Luego de que su hijo suspenda este medicamento, llame a su médico de inmediato si el niño ha tenido un cambio en la cantidad de la orina o si hay orina oscura, hinchazón, calor o dolor en la pierna o brazo, dolor u opresión en el pecho, tos con sangre, dificultad para respirar, debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambio en el equilibrio o cambio en la visión, confusión, cualquier hematoma o hemorragia anormal o convulsiones.

Soliris:

- Contusión.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Se han presentado casos de cataratas con el uso de este medicamento. Informe al médico sobre cualquier cambio en la vista.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Problemas para dormir.
- Dolor de espalda.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Signos de un resfrío común.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Dolor de cabeza.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Espasmo muscular.
- Pérdida del pelo.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de

responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-03-26

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Eculizumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center