EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Eltrombopag

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Alvaiz; Promacta

Nombres comerciales: Canadá
APO-Eltrombopag; Revolade

Advertencia

- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas hepáticos con este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de insuficiencia hepática si se toma junto con interferón y ribavirina en pacientes con hepatitis C. Si el médico de su hijo le indica que interrumpa la administración de interferón y ribavirina, será necesario que su hijo también interrumpa este medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para aumentar los recuentos plaquetarios.
- Este medicamento se utiliza para tratar la púrpura trombocitopénica inmune (ITP).
- Este medicamento se utiliza para tratar la anemia aplásica.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene un recuento bajo de plaquetas causado por otros problemas de salud.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- No deje de administrarle este medicamento a su hijo/a sin antes consultar con su médico. Su hijo/a puede presentar un mayor riesgo de tener hemorragias y un nivel muy bajo de plaquetas. Si su hijo/a necesita dejar de tomar este medicamento, consulte con su médico.
- Este medicamento puede empeorar las cataratas o aumentar la probabilidad de formar cataratas nuevas. Consulte al médico.
- Haga que el niño se someta a un examen de la vista según las indicaciones del médico.
- Si el niño es de ascendencia del este o del sur de Asía, consulte al médico. Es posible que el niño necesite una

dosis inicial más baja de este medicamento.

- Se han producido coágulos de sangre con este medicamento. En ocasiones, determinados coágulos de sangre como ataque cardíaco y accidente cerebrovascular han sido mortales. Consulte al médico.
- Tenga cuidado para evitar que su hijo se lastime, y evite que su hijo se caiga o tenga accidentes.
- Este medicamento no está aprobado para su administración en personas con cierto problema de la médula ósea llamado síndrome mielodisplásico (SMD). Si su hijo padece de SMD y toma este medicamento, el SMD puede empeorar y convertirse en un tipo de cáncer de la sangre llamado leucemia mielógena aguda (LMA). Si el SMD se convierte en LMA, su hijo podría morir más pronto debido a la LMA. Hable con el médico de su hijo si este tiene SMD.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento. Es posible que su hija también necesite usar métodos anticonceptivos durante 7 días después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al

médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.

- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Cualquier hematoma o sangrado que se produzca mientras toma y después de dejar de tomar este medicamento.
- Confusión.
- Hinchazón del vientre.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Fiebre o escalofríos.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene signos de un coágulo de sangre como dolor o presión de pecho, tos con sangre, falta de aire, hinchazón, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo; o problemas para hablar o para tragar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Tos.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Signos de un resfrío común.
- Espasmo muscular.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor en la boca.
- Dolor dental.
- Cambios en el color de la piel.
- Dolor en los brazos o las piernas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento sin una comida o con una comida con bajo contenido de calcio.
- Si su hijo toma otros medicamentos específicos, puede ser necesario administrar este medicamento a una hora diferente. Administre este medicamento al menos 2 horas antes o 4 horas después de consumir alimentos o bebidas con alto contenido de calcio, antiácidos o productos que tengan calcio, hierro, aluminio, magnesio, selenio o zinc. Entre los alimentos o bebidas con alto contenido de calcio, se incluye productos lácteos y algunas frutas, verduras y jugos.

Tabletas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- No las mezcle con ningún alimento o líquido.

Polvo para suspensión:

- Antes de administrar, asegúrese de saber cómo mezclar y medir la dosis de este medicamento. Consulte al médico o el farmacéutico si no está seguro.
- Este medicamento incluye una dosificación oral con jeringas. Cada jeringa se utiliza una sola vez. Deseche la jeringa luego de utilizarla. No utilice la misma jeringa más

de una vez.

- Mezcle el polvo con agua sólo según se indica.
- No utilice agua caliente para mezclar este medicamento.
- Administre la dosis a su hijo/a dentro de los 30 minutos después de la mezcla. Deseche la porción que no utilice luego de 30 minutos de la mezcla.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas

de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información

sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-01-26

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.

Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Eltrombopag - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center