EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Epinephrine (Systemic

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Adrenalin; Adrenalin-NaCl; Auvi-Q; Epinephrine Professional; EPINEPHrinesnap; EpinephrineSnap-EMS; Epinephrinesnap-v; EpiPen 2-Pak; EpiPen Jr 2-Pak; EPIsnap [DSC]; Neffy; Symjepi [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Adrenalin; Allerject [DSC]; Anapen Junior [DSC]; Anapen [DSC]; Emerade [DSC]; EpiPen; EpiPen Jr; Neffy

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar una reacción alérgica.
- Este medicamento se utiliza para tratar la presión baja.
- Este medicamento se utiliza durante una cirugía de los ojos.
- Este medicamento se utiliza cuando el corazón no está

latiendo.

- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si el niño es alérgico a los sulfitos, hable con un proveedor de salud médica. Algunos productos contienen sulfitos.
- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Todos los productos inyectables:

- No inyectar en los dedos, manos ni pies. Si lo hace, puede generar un flujo de sangre en esas áreas. Si se administra este medicamento por accidente, busque ayuda médica de inmediato.

Productos utilizados en el ojo:

- Las luces brillantes pueden provocar irritación. Dígale al niño que lleve lentes de sol.

Pulverizador nasal:

- Hable con el médico si su hijo tiene pólipos nasales o si alguna vez se ha quebrado, lesionado o le han operado la nariz. Este medicamento podrían no funcionar tan efectivamente.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.

- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco acelerado.
- Falta de aire.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Este medicamento ha provocado latidos cardíacos anormales graves. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Esto puede ser más probable si su hijo o hija ya tiene problemas del corazón o si consume ciertos medicamentos. Informe al médico inmediatamente si su hijo o hija tiene latidos cardíacos anormales.

Todos los productos inyectables:

- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.

Inyección (para reacciones alérgicas):

- En raras ocasiones, se produjeron infecciones en el lugar

en el que se administró este medicamento. A veces, estas infecciones pueden ser muy graves. Llame de inmediato al médico si su hijo presenta signos de infección como enrojecimiento que no desaparece, calor, hinchazón o sensibilidad.

Inyección (si se aplica en la vena):

- Este medicamento puede causar daño en los tejidos si se filtra medicamento de la vena. Informe a la enfermera de su hijo si el niño tiene enrojecimiento, ardor, dolor, inflamación, ampollas, llagas en la piel o pérdida de líquido en el sitio donde se le colocó el medicamento.

Pulverizador nasal:

- Confusión.
- Problemas o pérdida de la memoria.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Sentir ansiedad, nervios, excitación, temblores o inquietud.
- Náusea o vómito.
- Sudoración excesiva.
- Piel pálida.
- Dolor de cabeza.

Inyección:

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Piel erizada.

Pulverizador nasal:

- Irritación en la nariz o garganta.
- Hemorragia nasal.
- Hormigueo.
- Nervios.
- Goteo o congestión nasal.
- Sequedad de nariz o garganta.
- Estornudos.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de estómago.
- Entumecimiento en la boca

- Dolor en las encías de los dientes.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección (para reacciones alérgicas):

- Este medicamento se administra en forma de inyección en el músculo o en la capa de grasa de la piel.
- Este medicamento no debe administrarse por vía intravenosa.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.

- Mantenga este medicamento consigo y el niño en todo momento. Puede mantener extras en el trabajo, la escuela y el hogar.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Nunca ponga los dedos o la mano sobre la punta.
- Verifique el dispositivo antes de tener que usarlo para controlar que el seguro esté en su lugar y que puede sacar el dispositivo del envase. No quite el seguro hasta que esté listo para usar el dispositivo.
- Retire la tapa de seguridad. Deseche la tapa de seguridad inmediatamente después de usar este medicamento. Puede haber riesgo de asfixia si un niño o un animal doméstico se traga accidentalmente la tapa de seguridad.
- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
- No inyectar en los glúteos.
- Si administra este medicamento a su hijo, sostenga con fuerza su pierna para evitar heridas. Intente limitar el

movimiento de su hijo antes y durante la inyección.

- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Coloque nuevamente en el estuche.
- Llevelo con usted al hospital.
- Cada dispositivo tiene 1 sola dosis y no se puede volver a utilizar. Si necesita otra dosis, deberá usar un dispositivo nuevo.
- Si la reacción alérgica no mejora o los signos empeoran después de usar este medicamento, puede ser necesario tomar una segunda dosis como el médico se lo indicó. Asegúrese de saber cuánto tiempo debe esperar entre dosis. Lo mejor es siempre llevar 2 dispositivos con su hijo. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está túrbida o tiene partículas. Use una nueva.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.
- Si el dispositivo se ha activado por accidente, no lo utilice para una emergencia. Reemplace el dispositivo por uno nuevo.

Por otros motivos:

- El médico del niño le administrará este medicamento.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Mantenga este medicamento consigo y el niño en todo momento. Puede mantener extras en el trabajo, la escuela y el hogar.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- No retire este medicamento del envase hasta que esté listo para usarlo. No prepare ni pruebe el medicamento antes de utilizarlo.
- Cada dispositivo tiene 1 sola dosis y no se puede volver a utilizar. Si necesita otra dosis, deberá usar un dispositivo nuevo.
- Rocíe únicamente la nariz. No rocíe las paredes que unen las fosas nasales ni por fuera de la nariz.

- Si la reacción alérgica no mejora o los signos empeoran después de usar este medicamento, puede administrar una segunda dosis comenzando 5 minutos después de la primera dosis si el médico se lo indicó. Si necesita administrar 2 dosis, aplique la segunda en la misma fosa nasal que la primera. Lo mejor es siempre llevar 2 dispositivos con su hijo. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Asegúrese de que su hijo no inhale por la nariz mientras esté rociando este medicamento ni inmediatamente después de usarlo. Si su hijo inhala por accidente y los síntomas no mejoran o empeoran, adminístrele una segunda dosis en la misma fosa nasal empezando 5 minutos después de la primera.
- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.
- No congele este medicamento a propósito. Este medicamento puede utilizarse si fue congelado y descongelado. Si ocurre una emergencia y este medicamento está congelado, no espere a que se descongele. Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Inyección (si se aplica en la vena):

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todos los demás productos inyectables:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Proteja del calor, del frío y de la luz.

Inyección (para reacciones alérgicas):

- Guárdelo en el envase que le proporcionaron.

Pulverizador nasal:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Conserve este medicamento en el blíster hasta el momento de su uso. También puede guardarse en el estuche que viene con este medicamento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las

mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de

responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-04-17

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Epinephrine (Systemic - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center