

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Etanercept

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Enbrel; Enbrel Mini; Enbrel SureClick

Nombres comerciales: Canadá

Brenzys; Enbrel; Erelzi; Rymti

Advertencia

- Se han producido infecciones graves en pacientes que toman este medicamento. Algunas de estas han dado lugar a tratamientos en un hospital o provocado la muerte. La mayoría de las personas que tuvieron estas infecciones estaban tomando otros medicamentos que reducían el funcionamiento del sistema inmunitario, como el metotrexato o los medicamentos esteroides. Consulte con el médico si su hijo tiene algún tipo

de infección, si está tomando antibióticos ahora o los ha tomado recientemente o si ha tenido muchas infecciones.

- Se ha observado tuberculosis en pacientes que comenzaron a tomar etanercept. Estos pacientes habían estado expuestos a la tuberculosis anteriormente, pero nunca se habían infectado. Antes de comenzar a tomar este medicamento, su hijo se someterá a un análisis para averiguar si estuvo expuesto a la tuberculosis. También pueden hacerle pruebas de tuberculosis a su hijo mientras toma este medicamento.
- Las personas que toman este medicamento o medicamentos similares han presentado linfoma u otros tipos de cáncer. En algunos casos el paciente falleció. Consulte con el médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar ciertos tipos de artritis.
- Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis en placas.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene granulomatosis con poliangeítis.
- Si su hijo tiene una infección de la sangre u otra infección grave.
- Si su hijo toma alguno de estos medicamentos: abatacept o anakinra.
- Si su hijo está tomando ciclofosfamida.
- Si el niño usa otro medicamento como este. Si no está seguro, consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea

seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Consulte con el médico antes de que su hijo reciba vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones muy graves o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes de comienzo del tratamiento con este

medicamento.

- Asegúrese de que su hijo no se aplique una vacuna de bacterias debilitadas como la BCG para el cáncer de vejiga mientras usa este medicamento. Hable con el médico.
- Si el niño tiene un nivel alto de azúcar en sangre (diabetes), hable con el médico. Este medicamento puede reducir el contenido de azúcar en la sangre. Es posible que los medicamentos para la diabetes deban cambiarse.
- Hay riesgo de cáncer de piel. Procure que su hijo evite la exposición al sol, las lámparas solares y las camas solares. Use protector solar y vista a su hijo con ropa y gafas que lo protejan del sol.
- Haga controlar la piel de su hijo. Informe al médico de su hijo si presenta cambios en la piel como una verruga nueva, llagas o un bulto rojizo que sangra o que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.
- Si su hijo tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, hable con el médico de su hijo. Los medicamentos como este pueden hacer que el virus se active nuevamente. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales.

- La prueba de la hepatitis B se debe realizar según las indicaciones de su médico. Consulte con el médico.
- Si su hijo es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.
- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Algunos productos contienen alcohol bencílico. Si es posible, evite los productos con alcohol bencílico en recién nacidos o lactantes. En estos niños pueden producirse efectos secundarios graves con algunas dosis de alcohol bencílico, incluso si se administra con otros medicamentos que contengan alcohol bencílico. Hable con el médico para ver si este producto tiene alcohol bencílico en su composición.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

- Si su hijo tomó este medicamento durante el embarazo, informe al médico del bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Los signos de lupus como sarpullido en las mejillas u otras partes del cuerpo, predisposición a la quemadura solar, dolor muscular o en las articulaciones, dolor de pecho o falta de aire o hinchazón de los brazos o las piernas.
- Confusión.
- Piel pálida.
- Manchas rojas escamosas o bultos llenos de pus.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene las glándulas inflamadas, sudor nocturno, falta de aire o pérdida de peso.
- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas hepáticos con este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Es poco frecuente que las personas que consumen medicamentos similares a este tengan problemas en el sistema nervioso. A veces estos problemas no han desaparecido. Llame a su médico de inmediato si el niño tiene ardor, entumecimiento u hormigueo que no

se siente normal, cambio en la vista, mareos, convulsiones o debilidad en los brazos o las piernas.

- Este medicamento ha generado insuficiencia cardíaca, y las personas que ya padecían insuficiencia cardíaca, empeoraron. Informe al médico si el niño tiene alguna enfermedad del corazón. Llame a su médico de inmediato si a su hijo le falta el aire, aumenta mucho de peso, si tiene una frecuencia cardíaca que no es normal o una hinchazón en los brazos o las piernas reciente o que empeoró.
- En raras ocasiones, se presentaron problemas de médula ósea y sanguíneos con este medicamento. Esto incluye un grave problema de salud llamado anemia aplásica. En ocasiones, esto resultó mortal. Consulte con el médico de su hijo de inmediato si presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta; cualquier hematoma o hemorragia inexplicable; “manchas” púrpuras en su piel; o si se siente muy cansado o débil.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o

busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Diarrea.
- Dolor de cabeza.
- Signos de un resfrío común.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Este medicamento se administra por inyección en la parte grasa de la piel, en la parte superior del muslo, en la zona abdominal o en la parte superior de brazo.
- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la

enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.

- Lávese las manos antes y después de usar.
- No agitar.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Las diferentes marcas de este medicamento pueden ser transparentes o tener un color suave. Debe asegurarse del aspecto que debe tener su marca cuando esté listo para usar. No debe utilizarlo si la solución cambia de color. Si no está seguro, consulte al farmacéutico.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Autoinyectores, plumas prellenadas y jeringas prellenadas:

- Puede ser necesario dejar reposar este medicamento a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de administrarlo. No retire la tapa ni la cubierta hasta que esté listo para administrarlo. No caliente este medicamento. Si no está seguro de si la marca que usted tiene necesita estar a temperatura ambiente antes de utilizar el medicamento, hable con su farmacéutico o lea el prospecto del envase.
- Este producto puede contener pequeñas partículas blancas. No utilizar si la solución es turbia o si tiene fugas, grumos grandes, copos u otras partículas.
- No utilice este medicamento si se cayó o se está dañado.

Autoinyectores y plumas prellenadas:

- Verifique la ventana del autoinyector cuando se aplique la inyección. Si la ventana no muestra que se administró la dosis o si parece que todavía se está inyectando el medicamento, llame al médico de inmediato para averiguar qué hacer.

Vial de único uso:

- Para que la inyección resulte menos desagradable, saque este medicamento del refrigerador y déjelo reposar a temperatura ambiente por lo menos 30

minutos antes de usarlo. No retire la tapa ni la cubierta. No caliente este medicamento.

- Este producto puede contener pequeñas partículas blancas. No utilizar si la solución es turbia o si tiene fugas, grumos grandes, copos u otras partículas.

Envase con varias dosis:

- Debe mezclar este medicamento antes de tomarlo. Siga las instrucciones para mezclarlo exactamente como lo indicó el médico.
- Para hacer que la inyección resulte menos desagradable, saque este medicamento del refrigerador y déjelo reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de usarlo. No retire la tapa ni la cubierta. No caliente este medicamento.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

- Si no está seguro qué hacer si omite darle una dosis a su hijo, llame al médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento? Autoinyectores, plumas prellenadas y jeringas prellenadas:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- En caso de ser necesario, se puede conservar a temperatura ambiente. El tiempo que puede conservarse a temperatura ambiente depende del producto que utilice. Lea los prospectos de información para el paciente que se encuentran en el envase del producto para saber durante cuánto tiempo puede conservar el producto a temperatura ambiente.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

Inyección mediante autoinyector:

- Si utiliza el autoinyector reutilizable AutoTouch, no lo refrigere.

Vial de único uso:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Si es necesario, se puede almacenar a temperatura

ambiente durante un máximo de 30 días. Escriba la fecha en que retiró este medicamento del refrigerador. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 30 días, deseche el medicamento.

- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

Envase con varias dosis:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- En caso de ser necesario, se puede conservar a temperatura ambiente. El tiempo que puede conservarse a temperatura ambiente depende del producto que utilice. Lea los prospectos de información para el paciente que se encuentran en el envase del producto para saber durante cuánto tiempo puede conservar el producto a temperatura ambiente.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.
- Use inmediatamente después de mezclar o puede guardarlo en el refrigerador hasta 2 semanas.

Todas las presentaciones:

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Protéjase de las temperaturas demasiado cálidas o frías.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su

salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-05-31

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Etanercept - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center