

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Fluoride

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Clinpro 5000; Denta 5000 Plus; Denta 5000 Plus Sensitive; DentaGel; Easygel; Easygel [OTC]; Fluoridex; Fluoridex Daily Renewal; Fluoridex Enhanced Whitening; Fluoridex Sensitivity Relief; FluoriMax 5000; FluoriMax 5000 Sensitive; Fluoritab [DSC]; Fraiche 5000 Dental; Fraiche Rinse [OTC] [DSC]; Gel-Kam [OTC]; Just for Kids [OTC]; Just Right 5000; NaFrinse Daily Acidulated [DSC]; NaFrinse Daily/Neutral [DSC]; NaFrinse Drops [DSC]; NaFrinse Weekly [DSC]; NaFrinse [DSC]; Omni Gel [OTC]; Parodontax [OTC]; PerioMed [OTC]; PreviDent; PreviDent 5000 Booster Plus; PreviDent 5000 Dry Mouth; PreviDent 5000 Kids; PreviDent 5000 Ortho Defense; PreviDent 5000 Plus; Sensodyne Complete Protection [OTC]; Sensodyne Rapid Relief [OTC]; Sensodyne Repair & Protect [OTC]; SF; SF

5000 Plus; Sodium Fluoride 5000 Enamel; Sodium Fluoride 5000 Plus; Sodium Fluoride 5000 PPM; Sodium Fluoride 5000 Sensitive; SoluVita [OTC]

Nombres comerciales: Canadá

Butler Prophy Paste

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Este suplemento se utiliza para evitar las caries.

Fluoruro de sodio y nitrato de potasio:

- Este medicamento se utiliza para ayudar a tratar los dientes sensibles.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño tiene alguno de los trastornos siguientes: problemas en los huesos, problemas en las articulaciones, problemas en los riñones o úlceras.
- Si el fluoruro de su agua potable es mayor o igual a

0.6 partes por millón.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Dígale a su dentista si los dientes de su hijo se manchan.
- Cuide los dientes del niño. Visite regularmente al dentista.

- Este medicamento puede causar daño si se traga en gran cantidad. Si traga este medicamento en gran cantidad, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este medicamento a un niño.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Malestar estomacal intenso o vómitos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si su hijo padece efectos secundarios molestos o que no desaparecen.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tabletas masticables, líquido (gotas) o tabletas:

- Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si produce malestar estomacal.
- Administre este medicamento antes de que su hijo se acueste, después de cepillar los dientes del niño, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Algunos productos se usan todos los días mientras que otros solo 1 vez a la semana. Siga las instrucciones de su médico.
- No tome antiácidos que contengan magnesio o aluminio al mismo tiempo que toma este medicamento. Hable con el médico o farmacéutico.
- No administre productos que contengan calcio, como productos lácteos, durante 2 horas después de este medicamento.

Líquido (gotas):

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.
- Algunas marcas de gotas se deben mezclar con agua o

jugo de fruta. Verifique cómo se toma su marca.

Tabletas masticables:

- El niño debe masticar bien antes de tragar.
- Algunas marcas de este medicamento también se pueden disolver en la boca del niño. Consulte con el médico o farmacéutico.

Crema y pasta bucal:

- Utilice en lugar de la pasta dental habitual de su hijo, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Dígale al niño que se cepille con este medicamento durante 2 minutos y escupa.
- No permita que el niño trague el medicamento.
- Asegúrese de que su hijo no coma ni beba, ni se enjuague durante 30 minutos luego de usar este medicamento.

Fluoruro de sodio y nitrato de potasio:

- Procure que su hijo se enjuague bien y escupa el agua de enjuague.

Gel:

- Utilice en lugar de la pasta dental habitual de su hijo, a menos que su médico le indique lo contrario.

- Aplique una cantidad del tamaño de un guisante y haga que su hijo se cepille bien. Permita que el medicamento permanezca en los dientes de su hijo durante 1 minuto antes de que lo escupa.
- No permita que el niño trague el medicamento.
- Asegúrese de que su hijo no coma ni beba, ni se enjuague durante 30 minutos luego de usar este medicamento.

Enjuague oral:

- Procure que su hijo lo mueva en la boca siempre que se lo hayan indicado y luego que escupa.
- No permita que el niño trague el medicamento.
- Asegúrese de que su hijo no coma ni beba, ni se enjuague durante 30 minutos luego de usar este medicamento.
- Algunos productos se tienen que mezclar antes de su uso. Si es necesario mezclar el producto, no lo haga hasta que esté listo para utilizarlo. Utilícelo de inmediato después de mezclar.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis

faltante y continúe con el horario habitual del niño.

- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Líquido (gotas):

- Proteja de la luz.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras

personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la

evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-07-12

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Fluoride - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center