

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

FluPHENAZine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Advertencia

- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para reducir el número de tics del trastorno de tics crónico.
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por

alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas de salud: Lesión o enfermedad cerebral, enfermedad hepática o problemas en las células sanguíneas.
- Si su hijo tiene algún problema de salud o toma algún medicamento que le produzca mucho sueño.
- Si su hijo recientemente bebió una gran cantidad de alcohol o tomó un medicamento que podría retardar sus reacciones, como fenobarbital o algunos analgésicos, como oxicodona.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los

medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma

marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.

- Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este medicamento. Esto puede provocar caídas, lo que puede causar fracturas de huesos u otros problemas de salud.
- Este medicamento puede hacer que su hijo tenga más predisposición a las quemaduras por exposición solar. Tenga cuidado si su hijo estará expuesto al sol. Informe al médico de su hijo si se quema fácilmente al exponerse al sol mientras consume este medicamento.
- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.
- Si su hijo va a estar cerca de insecticidas fosforosos, hable con el médico.
- Se han presentado recuentos bajos de glóbulos blancos con el uso de este medicamento. Esto puede generar mayor riesgo de infección. En pocas ocasiones, las infecciones han sido mortales. Informe al médico si, en alguna oportunidad, el niño ha presentado un recuento bajo de glóbulos blancos. Comuníquese con el médico de inmediato si el niño tiene síntomas de infección como

fiebre, escalofríos o dolor de garganta.

- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede provocar que los resultados de algunas pruebas de embarazo sean erróneos. Hable con el médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Tomar este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede causar efectos secundarios o abstinencia en el recién nacido.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar

un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
- Falta de aire.
- Dificultad para tragar o hablar.
- Tics.
- Modificación del equilibrio.

- Salivación.
- Convulsiones.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambio en la vista.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Aumento del deseo sexual.
- Estreñimiento severo o dolor estomacal. Estos pueden ser signos de un problema intestinal grave.
- Aumento de tamaño de los pechos, secreción del pezón, incapacidad de conseguir o mantener una erección, cambios en el período menstrual.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre, calambres o rigidez en los músculos, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos acelerados, latidos que no parecen normales o sudoración excesiva.
- Algunas personas pueden tener un problema muscular

grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene problemas para controlar los movimientos corporales o problemas con la lengua, la cara, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale, mejillas hinchadas, fruncir la boca o masticar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Nerviosismo o excitabilidad.
- Agitación.
- Sueños extraños o peculiares.
- Estreñimiento.
- Boca seca.

- Somnolencia.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas.
- Disminución del apetito.
- Sudoración excesiva.
- Aumento o pérdida de peso.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Asegúrese de que su hijo beba mucho líquido sin cafeína, a menos que el médico indique lo contrario.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Todos los productos líquidos:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

Líquido (concentrado):

- Mezcle este medicamento con al menos 2 onzas (60 mL) de leche, gaseosa de naranja o algún jugo. No mezcle con bebidas con cafeína, té ni jugo de manzana. Tómelo inmediatamente después de mezclarlo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-03-02

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

FluPHENAZine - Last updated on March 4, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

