

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

## Infliximab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Avsola; Inflectra; Remicade; Renflexis; Zymfentra (1 Pen); Zymfentra (2 Pen); Zymfentra (2 Syringe)

### **Nombres comerciales: Canadá**

Avsola; Ixifi; Remdantry; Remicade; Remsima SC; Renflexis

## Advertencia

- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de infección, incluidas las infecciones graves. En ocasiones, las infecciones graves han provocado la muerte. La mayoría de las personas que tuvieron estas infecciones estaban tomando otros medicamentos que reducían el funcionamiento del sistema inmunitario, como el metotrexato o los medicamentos esteroides. Consulte con el médico si su hijo tiene algún tipo de infección, si está tomando antibióticos ahora o los ha tomado recientemente o si ha tenido muchas infecciones.
- Se ha observado tuberculosis (TB) en los pacientes que comenzaron a tomar infliximab. Estos pacientes habían estado expuestos a la tuberculosis anteriormente, pero nunca se habían infectado. Antes de comenzar a tomar este medicamento, su hijo se someterá a un análisis para averiguar si estuvo expuesto a la tuberculosis.
- Las personas que toman este medicamento o medicamentos similares han presentado linfoma u otros tipos de cáncer. En algunos casos el paciente falleció. Consulte con el médico.
- Con este medicamento y otros medicamentos similares, se ha presentado un tipo poco frecuente de cáncer llamado linfoma hepatoesplénico de las células T (HSTCL). Estos casos han sido mortales. Casi todos los casos ocurrieron en personas que tomaban medicamentos como este junto con otros medicamentos específicos (azatioprina o mercaptopurina). La mayoría de las veces, esto sucedió durante el tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Además, la mayoría de los casos se produjeron en varones adolescentes u hombres jóvenes. Consulte con el médico.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad de Crohn.
- Este medicamento se utiliza para tratar la colitis ulcerosa.

- Se utiliza para tratar ciertos tipos de artritis.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

### **Inyección (subcutánea):**

- La presentación de este medicamento no está aprobada para su uso en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento son mayores que los riesgos. Si su hijo debe tomar esta presentación de este medicamento, debe pedirle a su médico información sobre los riesgos y beneficios. Consulte con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre este medicamento.

## **¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño es alérgico a las proteínas de ratón, hable con un proveedor de salud médica.
- Si su hijo tiene insuficiencia cardíaca (corazón débil).
- Si su hijo padece alguna de las siguientes afecciones: inflamación de los vasos sanguíneos, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), esclerosis múltiple, problemas nerviosos o convulsiones.
- Si su hijo está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: abatacept, anakinra o tocilizumab.
- Si el niño usa otro medicamento como este. Si no está seguro, consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma

(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. En ocasiones, estos problemas han sido mortales. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes de comienzo del tratamiento con este medicamento.
- Asegúrese de que su hijo no se aplique una vacuna de bacterias debilitadas como la BCG para el cáncer de vejiga mientras usa este medicamento. Hable con el médico.
- Consulte con su médico antes de que su hijo/a reciba vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar la posibilidad de contraer una infección.

- Haga controlar la piel de su hijo. Informe al médico de su hijo si presenta cambios en la piel como una verruga nueva, llagas o un bulto rojizo que sangra o que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.
- Si su hijo tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, este medicamento puede hacer que el virus se active. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales. Se le realizarán pruebas de hepatitis B a su hijo antes de comenzar el tratamiento con este medicamento. Tendrá que estar alerta de los signos de hepatitis mientras su hijo toma este medicamento y por varios meses luego de que deje de tomarlo. Hable con el médico del niño.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Si su hija usó este medicamento durante el embarazo, informe al médico del bebé. Deberá hablar con el médico sobre la seguridad y el momento de administrar ciertas vacunas.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la

garganta.

- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Los signos de lupus como sarpullido en las mejillas u otras partes del cuerpo, predisposición a la quemadura solar, dolor muscular o en las articulaciones, dolor de pecho o falta de aire o hinchazón de los brazos o las piernas.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Piel pálida.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Dolor pélvico.
- Flujo vaginal.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Manchas rojas escamosas o bultos llenos de pus.
- Fiebre, escalofríos, comezón, urticaria, dolor o presión en el pecho o falta de aire durante la infusión.
- Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene las glándulas inflamadas, sudor nocturno, falta de aire o pérdida de peso.
- En algunos casos, las reacciones alérgicas ocurrieron hasta 12 días después de haber tomado este medicamento. Informe al médico inmediatamente si su hijo o hija tiene fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor muscular o articular, hinchazón de la cara o las manos, o dificultad para tragar.
- Se han producido latidos cardíacos anormales, ataques cardíacos, presión arterial alta o baja y accidentes cerebrovasculares durante la infusión de productos que contienen infliximab y dentro de las 24 horas posteriores. En ocasiones, los ataques cardíacos fueron mortales. También ocurrieron casos de pérdida de visión a corto plazo durante la infusión o dentro de las 2 horas

posteriores. Informe al médico inmediatamente si su hijo tiene latidos cardíacos anormales; dolor o presión en el pecho; pérdida de la visión; signos de presión arterial alta o baja, como dolor de cabeza intenso, mareos o desmayos; debilidad en un lado del cuerpo; problemas para hablar o pensar; cambios en el equilibrio; confusión; caída de un lado de la cara o visión borrosa.

- Es poco frecuente que las personas que consumen medicamentos similares a este tengan problemas en el sistema nervioso. A veces estos problemas no han desaparecido. Llame a su médico de inmediato si el niño tiene ardor, entumecimiento u hormigueo que no se siente normal, cambio en la vista, mareos, convulsiones o debilidad en los brazos o las piernas.
- Es muy poco común que se produjeran problemas hepáticos con este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Este medicamento ha generado insuficiencia cardíaca, y las personas que ya padecían insuficiencia cardíaca, empeoraron. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Informe al médico si su hijo tiene alguna enfermedad cardíaca. Llame al médico de inmediato si a su hijo le falta el aire, aumenta mucho de peso, o tiene una frecuencia cardíaca que no es normal, o hinchazón en los brazos o las piernas que es reciente, o que empeoró.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.
- Se siente cansado o débil.

- Acaloramiento.
- Signos de un resfrío común.
- Dolor, enrojecimiento, hinchazón u otra reacción en el lugar donde se administró la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

## **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento

fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

## Última fecha de revisión

2024-08-15

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Infliximab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

## Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center