

# Lactobacillus

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Advanced Probiotic [OTC]; Bilac; Biomevia; Biostora [DSC]; Culturelle Baby [OTC]; Culturelle [OTC]; DermacinRx Probisol [OTC]; Dialyvite Probiotic [OTC]; Floranex [OTC]; Florraxis [DSC]; Gutvite Immune Support [OTC]; Kala [OTC]; Lactinex [OTC]; Lacto-Bifidus [OTC]; Lacto-Pectin [OTC]; Lacto-TriBlend [OTC]; Megadophilus [OTC]; MicroFlor [OTC]; MoreDophilus [OTC]; Nexiva; NuGut Bowel Support [OTC]; Paxotin; Pedia-Lax Probiotic Yums [OTC]; Probionyx; Probitrol [OTC]; Promella in Prebiotic; Promerol; ReZyst IM [DSC]; Risa-Bid [OTC]; RisaQuad [OTC]; RisaQuad-2 [OTC]; Superdophilus [OTC]; Symbiara; Visbiome Advanced GI Care [OTC]; Visbiome GI Care [OTC]; VSL #3 [OTC]; VSL #3-DS; Zenvyra

## Nombres comerciales: Canadá

Bacid; Bio-K+; Fermalac

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para mantener el equilibrio normal de bacterias en el tubo digestivo.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su

médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si el paciente es un lactante prematuro o pesa menos de 1 kg (2,2 libras).

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si la dieta del niño es sin lactosa, consulte al médico. Algunos productos contienen lactosa.
- Si su hijo tiene un nivel alto de azúcar en sangre (diabetes), controle las etiquetas cuidadosamente. Algunos productos contienen azúcar.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este medicamento a un niño.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas

personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Sed inusual.
- Cambio en la cantidad de orina.
- Dolor muscular.
- Dolor de huesos.
- Pérdida de peso.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Gases.
- Náusea o vómito.
- Disminución del apetito.
- Cólicos abdominales.
- Boca seca.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Tabletas y cápsulas:**

- Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si produce malestar estomacal.
- Puede esparcir el contenido de la cápsula en comida suave o líquido. Anime al niño a no masticarla.

### **Tabletas masticables y obleas:**

- El niño debe masticar bien antes de tragar.
- EL niño debe beber una pequeña cantidad de agua, leche o jugo de frutas después de tragar este medicamento.

### **Cápsulas de liberación retardada:**

- Procure que su hija trague el medicamento entero. No permita que su hija lo mastique, abra o triture.
- Si su hijo está tomando antibióticos, administre este medicamento al menos de 2 a 3 horas después de que su hijo haya tomado los antibióticos.

### **Gránulos:**

- Mezcle con cereal, comida o leche.
- No mezcle este medicamento con alimentos tibios o calientes, o con bebidas.

## **Polvo:**

- Mezcle con agua y d selo al ni o para beber.
- Tambi n se puede mezclar con pur  de manzanas o yogur.
- No mezcle este medicamento en bebidas calientes o tibias.
- Si su hijo est  tomando antibi ticos, administre este medicamento al menos 1 hora antes o 2 horas despu s de que su hijo tome los antibi ticos.

## **L quido (gotas):**

- Agite bien antes de usar.
- Este medicamento se puede administrar con una cuchara. Algunas marcas pueden mezclarse con agua, leche materna, f rmula u otros l quidos, o administrarse en el pecho. Aseg rese de saber c mo debe administrar este medicamento.
- No mezcle este medicamento en bebidas calientes o tibias.
- Mida cuidadosamente las dosis del l quido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, p dale al farmac utico un dispositivo para medir este medicamento.

## ** Qu  debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Administre la dosis que olvid  lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, s ltese la dosis faltante y contin e con el horario habitual del ni o.
- No administre 2 dosis simult neamente ni administre dosis adicionales.

## ** C mo almaceno o descarto este medicamento?**

- Siga las instrucciones de almacenamiento.
- Algunas marcas de este medicamento se deben almacenar en el refrigerador. Algunas marcas de este medicamento se deben almacenar a temperatura ambiente. Si tiene preguntas sobre c mo almacenar este

medicamento, hable con su farmacéutico.

- Asegúrese de saber cuánto tiempo puede conservar este medicamento antes de tener que desecharlo.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente

específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2026-04-20

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Lactobacillus - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center