EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lomitapide

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Juxtapid

Nombres comerciales: Canadá

Juxtapid

Advertencia

- Este medicamento podría causar problemas del hígado en algunos pacientes. Se deberá estar atento a cualquier problema del hígado en los análisis de sangre. Consulte al médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para disminuir el colesterol.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene enfermedad hepática o valores altos de enzimas hepáticas.

- Si le han dicho que el cuerpo de su hijo tiene problemas con ciertos azúcares (lactosa, glucosa, galactosa).
- Si su hijo está tomando cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, infecciones, depresión y otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si su hija está o podría estar embarazada. No administre este medicamento a su hija durante el embarazo.
- Si la niña está amamantando a un bebé. Asegúrese de que la niña no amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Su hijo debe seguir el plan de alimentación y el programa de ejercicio según las recomendaciones del médico.
- Una dieta baja en grasas puede ayudar a reducir el riesgo de problemas estomacales. Haga que su hijo mantenga una dieta con menos de 20 % de

energía procedente de grasas o menos de 30 g de grasa, el que sea menor. Consulte al médico.

- Puede que su hijo deba tomar ciertos suplementos como vitamina E y ácidos grasos mientras toma este medicamento. Asegúrese de respetar lo que el médico de su hijo le indicó.
- Evite dar al niño toronja o jugo de toronja (pomelo).
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- No administre colesevelam, colestipol o colestiramina 4 horas antes o después de tomar este medicamento.
- Si su hijo tiene diarrea o vómitos, otros medicamentos ingeridos por la boca podrían no ingresar en su organismo. Si su hija toma píldoras anticonceptivas, deberá usar un tipo de anticonceptivo adicional, como un condón, durante 7 días después de que se detenga la diarrea o los vómitos. Si tiene alguna pregunta, consulte al médico.
- Si el paciente es un menor por debajo del percentil 10 de altura, peso o índice de masa corporal (IMC), puede necesitar controles periódicos del crecimiento. Consulte al médico.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 2 semanas después de su última dosis, a menos que le indiquen lo contrario. Asegúrese de saber durante cuánto tiempo su hija debe usar los anticonceptivos. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo

llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Dolor de pecho.
- Latidos cardíacos anormales.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Sensación de necesidad de defecar con frecuencia.
- Sensación de necesitar defecar con urgencia.
- En ocasiones, fue necesario ir al hospital debido a una diarrea grave. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta diarrea grave o diarrea que no desaparece. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene signos de deshidratación, como mareos intensos o desmayos, tiene problemas para orinar o cambia la cantidad de orina, o se siente muy cansado.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda

médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Cólicos abdominales.
- Hinchazón de estómago.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Gases.
- Estreñimiento.
- Ardor de estómago.
- Pérdida de peso.
- Dolor de espalda.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor de cabeza.
- Con este medicamento es común tener diarrea, malestar estomacal, vómitos y dolor de estómago. Una dieta baja en grasas puede ayudar a reducir la probabilidad de sufrir estos efectos secundarios. Llame al médico si alguno de estos efectos secundarios es grave, le molesta a su hijo o no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Adminístrelo al menos 2 horas después de la cena.
- No lo administre con comida. Puede causar malestar estomacal.

- Asegúrese de que su hijo trague este medicamento entero con agua.
- Si su hijo no puede tragar este medicamento entero, abra la cápsula y espolvoree el contenido sobre 15 ml (1 cucharada) de compota de manzana o puré de plátano.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si se deja de tomar el medicamento durante más de 1 semana, consulte al médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el

médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2026-03-12

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Lomitapide - Last updated on March 14, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering Cancer Center