

Maralixibat

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Livmarli

Nombres comerciales: Canadá

Livmarli

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la picazón en ciertas personas con la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC).
- Se utiliza para tratar la picazón en personas con síndrome de Alagille (ALGS).

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo ha sufrido una insuficiencia hepática que le haya causado problemas graves como hemorragias, inflamación o problemas cerebrales.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los

problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Quizá su hijo deba tomar ciertos suplementos como vitamina A, D, E y K mientras toma este medicamento. Asegúrese de respetar lo que el médico le ha indicado.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de fracturas. Consulte al médico.
- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Use la solución oral con precaución en niños. El propilenglicol es un componente de la solución oral de este medicamento y puede causar efectos secundarios graves en los niños. Los niños menores de 5 años pueden tener un riesgo mayor.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas

personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Dolor de huesos.
- Fiebre, debilidad o palidez.
- Latidos cardíacos anormales.
- Convulsiones.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Sentirse muy somnoliento o mareado.
- Calambres musculares.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. A veces, esto fue grave y ha llegado a requerir un trasplante de hígado u ocasionar la muerte. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta signos de nuevos o peores problemas hepáticos como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal, dolor estomacal, inflamación o aumento de peso rápido, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene diarrea grave o duradera, vómitos. Llame al médico si su hijo tiene diarrea con heces con sangre o signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos; sed; dolor de cabeza, incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, latidos rápidos; mareos; respiración acelerada o confusión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Es común tener diarrea, dolor de estómago, vómitos y malestar estomacal mientras toma este medicamento. Si su hijo tiene estos efectos secundarios, comuníquese con el médico para averiguar cómo evitar la deshidratación.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento 30 minutos antes de una comida.
- Si administra este medicamento una vez al día, adminístrelo por la mañana.
- Haga que su hijo se siente o se pare para tomar este medicamento. No administre este medicamento a su hijo mientras está acostado.
- Haga que su hijo espere unos minutos después de tomar este medicamento antes de acostarse.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- No administre colesevelam, colestipol o colestiramina 4 horas antes o después de tomar este medicamento.

Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- No utilice una cucharilla doméstica ni ningún otro dosificador para medir la dosis.
- Deseche el dispositivo de medición después de 100 días. Utilice uno nuevo. Si no tiene un nuevo dispositivo de medición, consulte al farmacéutico.
- Coloque la punta del dispositivo de medición contra el interior de la mejilla. Empuje el émbolo lentamente para administrar toda la dosis. Limpie el dispositivo de medición con agua después de cada uso.
- Vuelva a tapar después de administrarle la dosis al niño.
- Si su hijo no puede tomar la dosis completa, omita la parte faltante y adminístrele la siguiente dosis en el horario habitual.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Si se administra 1 vez al día:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si han transcurrido más de 12 horas desde la dosis faltante, omítala y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

Si se administra 2 veces al día:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si han transcurrido más de 6 horas desde la dosis faltante, omítala y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Solución oral:

- Una vez abierto, almacénelo a temperaturas inferiores a 30 °C (86 °F). Deseche todas las partes que no haya utilizado después de 100 días de abierto.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el

diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-08-12

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Maralixibat - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center