EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Metoclopramide

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Gimoti; Reglan

Nombres comerciales: Canadá

MAR-Metoclopramide; Metonia [DSC]; PMS-Metoclopramide; PMS-Metoclopramide HCl; PRZ-Metoclopramide

Advertencia

- En ocasiones, puede presentarse un problema muscular grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de dejar de tomar este medicamento, pero es posible que no desaparezca. Este problema puede disminuir o desaparecer después de dejar de tomar este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor con diabetes y en los adultos mayores, especialmente las mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Este medicamento también puede hacer que sea más difícil saber si su hijo presenta signos de discinesia tardía. No administre este medicamento a su hijo si alguna vez ha padecido discinesia tardía. Si no está seguro, consulte con el médico.
- Llame al médico de inmediato si su hijo presenta signos de discinesia tardía, como dificultad para controlar los movimientos corporales, inquietud o problemas con la lengua, cara, boca o mandíbula, como sacar la lengua, inflar las mejillas, fruncir la boca o masticar.
- Evite administrar este medicamento durante más de 12 semanas a menos que el médico haya decidido que los beneficios de administrar este medicamento superan los riesgos.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE, reflujo de ácido).
- Se utiliza para aliviar los síntomas del vaciado lento del estómago (gastroparesia) en personas diabéticas.
- Se utiliza para prevenir el malestar estomacal y los vómitos después de la quimioterapia o cirugía.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

Niños:

- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo alguna vez tuvo un problema muscular grave (discinesia tardía) u otro problema muscular al tomar este medicamento.
- Si su hijo tiene o alguna vez tuvo depresión o pensamientos suicidas.
- Si su hijo presenta alguno de los siguientes problemas de salud: hemorragia gastrointestinal, orificio en el tubo digestivo, obstrucción intestinal, feocromocitoma o convulsiones, enfermedad de Parkinson o presión arterial alta.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si el médico le ha dicho que su hijo es un metabolizador lento de algunos medicamentos.
- Si su hijo toma algún medicamento que aumente la posibilidad de causar movimientos corporales que no pueda controlar. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- Si su hijo toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas) que no debe tomarse junto con este

medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar la depresión, el dolor o la enfermedad de Parkinson. Existen muchos medicamentos que no deben tomarse con este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Evite darle a su hijo marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Si deja de administrarle este medicamento a su hijo en forma repentina, es

posible que presente síntomas de abstinencia. Informe al médico si su hijo padece algún efecto grave.

- Si su hijo es alérgico a la tartrazina (FD&C Amarillo n.º 5), consulte con el médico de su hijo. Algunos productos contienen tartrazina.
- Si el niño tiene fenilcetonuria (PKU), consulte al médico. Algunos productos contienen fenilalanina.
- No le administre a su hijo una dosis mayor de la indicada por el médico. La administración de una dosis mayor de este medicamento puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios graves.
- No administre este medicamento durante más tiempo del que le indicó el médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.

- Agitación.
- Problemas para dormir.
- Temblor, dificultad para movilizarse, entumecimiento.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibro, problemas para tragar o hablar.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Cambio en la frecuencia con la que orina.
- Incapacidad de controlar las ganas de orinar.
- Cambio en la vista.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Aumento de tamaño de los pechos o secreción del pezón.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre, calambres o rigidez en los músculos, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos acelerados, latidos que no parecen normales o sudoración excesiva.
- Este medicamento puede provocar un problema grave, y a veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos. Llame al médico de su hijo niño de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.
- En algunos casos, ha producido depresión y pensamientos suicidas. Algunas personas que tomaron este medicamento se han suicidado. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene signos de depresión, pensamientos suicidas, altibajos emocionales, pensamiento anormal o falta de interés en la vida.

Si su hija tiene períodos menstruales:

- Cambios en el período (menstrual).

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Incapacidad de conseguir o mantener una erección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Administre este medicamento al menos 30 minutos antes de las comidas de su hijo y antes de que se acueste a menos que el médico indique lo contrario.

Tableta de disolución oral:

- No retire el medicamento del blíster hasta que esté listo para administrárselo a su hijo. Una vez abierto el blíster, administre el medicamento de inmediato. No guarde el medicamento que retiró del blíster para usarlo posteriormente.
- Despegue el aluminio del blíster. No empuje la tableta fuera del envoltorio de aluminio cuando lo abra. Con las manos secas, retírela del envoltorio de aluminio. Colóquela sobre la lengua de su hijo o hija y asegúrese de que deje que se disuelva. No se requiere agua. No deje que su hijo o hija mastique, rompa ni triture la tableta.

Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

Inyección:

- Se administra en forma de inyección en un músculo o vena.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?
Todos los productos orales:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Todos los productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un

lugar seco. No conservar en un baño.

Solución oral:

- No congelar.

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2026-02-27

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Metoclopramide - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center