

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Miconazole (Topical)

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

7 Day Vaginal [OTC]; Aloe Vesta Antifungal [OTC]; Aloe Vesta Clear Antifungal [OTC] [DSC]; Antifungal [OTC]; Azolen Anti-Fungal Wash [OTC]; Azolen Tincture [OTC]; Baza Antifungal [OTC]; Cavilon [OTC] [DSC]; Critic-Aid Clear AF [OTC] [DSC]; Cruex Prescription Strength [OTC]; DermacinRx Lasolex AC [OTC]; DermacinRx Lasolex AL [OTC]; Desenex Jock Itch [OTC]; Desenex [OTC]; FT Antifungal [OTC]; FT Miconazole 1 [OTC]; FT Miconazole 3 Comb Pack-Supp [OTC]; FT Miconazole 3 Combo Pack [OTC]; FT Miconazole 7 [OTC]; Fungizyl AC [DSC]; Fungizyl AL [DSC]; Fungoid Tincture [OTC]; GoodSense Anti-Fungal [OTC]; GoodSense Miconazole 1 [OTC] [DSC]; Lasolex AG [OTC]; Lotrimin AF Deodorant Powder [OTC] [DSC]; Lotrimin AF Jock Itch Powder [OTC] [DSC]; Lotrimin AF Powder [OTC] [DSC]; Medpura Antifungal [OTC];

Micaderm [OTC]; Micatin [OTC] [DSC]; Miconazole 3; Miconazole 3 Combo Pack [OTC]; Miconazole 3 Combo-Supp [OTC]; Miconazole 3 [OTC]; Miconazole 7 [OTC]; Miconazole Antifungal [OTC]; Miconi-AL [OTC] [DSC]; Micotrin AP [OTC]; Micro Guard [OTC]; Mycozyl AP [OTC]; Secura Antifungal Extra Thick [OTC]; Zeasorb-AF [OTC] [DSC]

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Todos los productos para la piel:

- Este medicamento se utiliza para tratar infecciones fúngicas de la piel.

Todos los productos vaginales:

- Este medicamento se utiliza para tratar infecciones vaginales por hongos.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Todos los productos para la piel:

- Si su hijo tiene infección en las uñas o en el cuero cabelludo. Este medicamento no es eficaz para tratar infecciones en las uñas o en el cuero cabelludo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.

- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Líquido (solución) y aerosol:

- Este medicamento puede incendiarse. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.

Todos los productos vaginales:

- Si las infecciones vaginales por hongos se producen a menudo, consulte al médico.
- No utilice este medicamento para tratar la picazón ocasionada por un problema de salud distinto de la infección vaginal por hongos. Consulte al médico.
- No administre este medicamento a su hija si tiene dolor abdominal, fiebre o flujo con mal olor. Hable con el médico.
- No permita que la niña se realice duchas vaginales ni utilice otros productos vaginales como tampones mientras ella se administra este medicamento. Es posible que su hija deba evitar estas prácticas durante

un tiempo después de su última dosis. Consulte con el pediatra de su hijo si tiene preguntas.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Debe evitarse el sexo vaginal durante el uso de este medicamento.
- Es posible que los condones o los diafragmas no eviten el embarazo ni detengan la propagación de enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales mientras se consuma este medicamento y durante un periodo después de que su hijo suspenda la administración de este medicamento. Su hija deberá utilizar algún otro método anticonceptivo durante un tiempo después de su última dosis. Asegúrese de saber cuánto tiempo su hija deberá hacer esto.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

Todos los productos para la piel:

- Enrojecimiento, hinchazón o irritación intensa donde se utilizó este medicamento.

Todos los productos vaginales:

- Dolor estomacal grave.
- Náusea o vómito.
- Flujo vaginal con mal olor.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Ardor o escozor.

Todos los productos vaginales:

- Irritación vaginal.
- Cólicos abdominales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos para la piel:

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico de su hijo u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el médico.

Crema, líquido (solución) y pomada:

- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.

Pulverizador:

- Agite bien antes de usar.
- Rocíe una capa fina sobre la piel afectada.

Polvo:

- Rocíe el polvo en la zona afectada.

Todos los productos vaginales:

- No administre este medicamento por la boca. Solo para uso vaginal. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos del niño (puede arder).
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico de su hijo u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Para obtener mejores resultados utilícelo a la hora de

acostarse.

- Asegúrese de que su hija seque completamente el área vaginal externa luego de ducharse, bañarse o nadar. Procure que su hijo se cambie el traje de baño mojado o la ropa deportiva húmeda de inmediato.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera

de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Líquido (solución):

- Proteja del calor o del fuego.

Pulverizador:

- Proteja del calor y de llama abierta. No perfora ni quemé el producto, incluso si parece vacío.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-01-14

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Miconazole (Topical - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

