

# Mycophenolate

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Nombres comerciales: EE. UU.**

CellCept; CellCept Intravenous; Myfortic; Myhibbin

## **Nombres comerciales: Canadá**

ACH-Mycophenolate; APO-Mycophenolate; APO-Mycophenolic Acid; CellCept; CellCept IV; JAMP-Mycophenolate; JAMP-Mycophenolic Acid; MAR-Mycophenolate Mofetil; MAR-Mycophenolic Acid; Myfortic; SANDOZ Mycophenolate Mofetil; TEVA-Mycophenolate

## Advertencia

- El uso de este medicamento durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la muerte del feto. Si la niña puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo para prevenir el embarazo mientras tome este medicamento. Su médico debe hablar con usted sobre cómo evitar un embarazo mientras toma este medicamento. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se realizará una prueba de embarazo y se repetirá 8 o 10 días después para demostrar que la niña NO está embarazada. Si la niña queda embarazada o planea hacerlo mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, como el linfoma o cáncer de piel. Llame al médico de su hijo de inmediato si presenta un cambio en el color o tamaño de un lunar, un crecimiento o bulto en la piel, una gran pérdida de peso, sudores nocturnos o glándulas inflamadas.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar una infección. Algunas infecciones han sido la causa de muerte. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Mantenga al niño alejado de personas que estén resfriadas, engripadas o que tengan infecciones.
- Llame al médico de su hijo de inmediato si observa que su hijo presenta signos de infección tales como fiebre, escalofríos, signos de gripe, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, llagas en la boca o una herida que no cicatriza.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para evitar que el organismo dañe al órgano después de un trasplante de órgano.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al

médico.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si la niña tiene el síndrome de Lesch-Nyhan o Kelley-Seegmiller o una deficiencia heredada rara de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGP).
- Si su hijo toma alguno de los siguientes medicamentos: azatioprina, colestiramina, colesevelam, colestipol, norfloxacin con metronidazol o sevelámero.
- Si su hijo está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si la niña puede quedar embarazada y no usa 2 tipos de métodos anticonceptivos.

### Si su hija está amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija amamanta o planea hacerlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.
- Consulte con el médico antes de que su hijo reciba vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones muy graves o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- Es posible que el niño sangre más fácilmente. Asegúrese de que su hijo tenga cuidado y evite lesionarse. Asegúrese de que su hijo tenga un cepillo de dientes suave.
- Hay riesgo de cáncer de piel. Procure que su hijo evite la exposición al sol, las lámparas solares y las camas solares. Use protector solar y vista a su hijo con ropa y gafas que lo protejan del sol.
- Se pueden realizar análisis de hepatitis B o C. Una infección por hepatitis B o C puede empeorar mientras tome este medicamento.
- Este medicamento ha causado hemorragia, orificios y úlceras en el tracto gastrointestinal (GI). En ocasiones las personas tuvieron que hospitalizarse. Consulte con el médico.
- Este medicamento puede causar diarrea. Si su hijo tiene diarrea, consulte con el médico sobre las formas de disminuir este efecto. No deje de administrar este medicamento a su hijo sin consultar antes al médico.
- Si el niño tiene fenilcetonuria (PKU), consulte al médico. Algunos productos contienen fenilalanina.

- Es posible que su hijo deba evitar donar sangre mientras tome este medicamento y durante un tiempo después. Consulte con el médico.
- Es posible que su hijo deba evitar donar esperma mientras tome este medicamento y durante un tiempo después. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
- Se han producido reacciones alérgicas con productos de micofenolato. La mayoría de las veces, esto ocurrió desde unas pocas horas y hasta el día siguiente al inicio del tratamiento. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

### **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Su hija debe usar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 6 semanas después de su última dosis. Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia para prevenir el embarazo. Si su hija usa métodos anticonceptivos hormonales, también debe usar algún otro tipo de anticonceptivo, como el preservativo, durante este periodo. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si su hijo tiene una pareja sexual que puede quedar embarazada, se debe usar un método anticonceptivo mientras se tome este medicamento y por lo menos 90 días después de la última dosis. Si la pareja de su hijo queda embarazada, llame al médico de inmediato.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;

opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Mareos o desmayos.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Calambres musculares.
- Inflamación.
- Piel pálida.
- Manchas blancas en la boca.
- Picazón o flujo vaginal.
- Piel u ojos amarillentos.

- La aplicación de este medicamento ha causado un problema de salud llamado síndrome inflamatorio agudo (AIS). En ocasiones, las personas han tenido que ir al hospital. La mayoría de las veces, los signos aparecieron semanas o meses después de comenzar a tomar este medicamento o después de un aumento de la dosis. Llame al médico de inmediato si el niño tiene fiebre, dolor o entumecimiento articular, o dolor muscular.
- Este medicamento puede causar un problema cerebral grave llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). Puede provocar discapacidad o puede ser mortal. Informe al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas como confusión, problemas de memoria, depresión, cambios en su comportamiento, cambios en la fuerza de 1 lado del cuerpo que es mayor que la del otro lado, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la vista.
- Algunas personas tratadas con este medicamento han tenido problemas renales muy graves causados por una infección viral específica (virus BK). En personas con trasplante de riñón, la infección por virus BK puede causar la pérdida del riñón. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas de enfermedad renal como cambio en la cantidad de orina, problemas o dolor al orinar o sangre en la orina.
- Algunas personas presentaron problemas de pulmón al tomar este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de su hijo de inmediato si muestra signos de problemas de pulmón, como falta de aire u otro problema para respirar, aparición o agravamiento de la tos o fiebre.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

**Todas las presentaciones:**

- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor de espalda.
- Gases.
- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- Temblores.
- Problemas para dormir.

### **Inyección:**

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todos los productos orales:**

- Tome el medicamento con el estómago vacío al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas a menos que su médico le indique lo contrario.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Si su hijo está tomando un antiácido que contenga aluminio o magnesio, debe consumirlo al menos 2 horas después de tomar este medicamento.

## Todos los productos de tabletas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.

## Cápsulas:

- Procure que su hija trague el medicamento entero. No permita que su hija lo mastique, abra o triture.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.
- Si la cápsula está abierta o rota, no toque el contenido. Si los contenidos se tocan o entran en los ojos, lávese las manos o los ojos de inmediato.

## Todos los productos de suspensión:

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.
- No lo mezcle con ningún otro medicamento líquido.
- Use guantes al preparar y administrar una dosis.
- Si este medicamento entra en contacto con la piel de su hijo, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Si este medicamento entra en sus ojos, enjuague con agua fría.
- Si se derrama este medicamento, límpielo con toallas de papel húmedas. Limpie el exterior del frasco después de haber puesto el tapón.
- Este medicamento puede administrarse a través de ciertos tamaños de sondas de alimentación. Algunos tamaños de sondas de alimentación no deben usarse para administrar este medicamento. Utilice este medicamento según se le ha indicado. Enjuague la sonda de alimentación luego de administrar este medicamento. Si no está seguro de si lo puede usar con una sonda de alimentación, hable con el médico.

## **Inyección:**

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

## **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

### **Tabletas de liberación retardada:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

### **Todos los demás productos orales:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si faltan menos de 2 horas para que su hijo tome la próxima dosis, saltee la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## **Inyección:**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Polvo para suspensión:**

- Conservar a temperatura ambiente o en el refrigerador después de mezclar la suspensión. No lo congele.
- Deseche la porción que no utilice al cabo de 60 días de haber mezclado este medicamento. Pregúntele al farmacéutico si no está seguro de cuándo fue.

### **Líquido (suspensión):**

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

## **Todos los demás productos orales:**

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

## **Inyección:**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

## **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

# Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2025-07-18

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Mycophenolate - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center