

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ocrelizumab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Ocrevus

Nombres comerciales: Canadá

Ocrevus

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esclerosis múltiple.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si su hijo tuvo una reacción potencialmente mortal mientras recibía este medicamento o en las 24 horas siguientes.
- Si el niño tiene una infección.
- Si su hijo tiene una infección de hepatitis B activa.
- Si su hijo es menor de 10 años o pesa menos de 25 kg (55 libras).

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del

niño.

- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si su hijo ha tenido hepatitis B anteriormente o es portador del virus, este medicamento puede provocar que el virus se reactive. Esto puede ocasionar problemas hepáticos graves y, en ocasiones, mortales. Se le realizarán pruebas de hepatitis B a su hijo antes de comenzar el tratamiento con este medicamento. Consulte al médico.
- Consulte al médico antes de que su hijo/a reciba vacunas. El uso de algunas vacunas junto con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones o provocar la falta de eficacia de la vacuna.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes del comienzo del tratamiento con este medicamento. Hable con el médico de su hijo para saber cuándo necesita recibir alguna vacuna antes de comenzar a tomar este medicamento.
- Es posible que su hijo/a tenga más probabilidades de contraer una infección. Algunas infecciones fueron graves o mortales. Haga que su hijo/a se lave las manos con frecuencia. Mantenga a su hijo/a lejos de personas que estén resfriadas, engripadas o que tengan

infecciones.

- Este medicamento puede reducir la cantidad de un tipo de anticuerpo (inmunoglobulina) en la sangre de su hijo. Los niveles bajos de estos anticuerpos pueden aumentar el riesgo de infecciones graves. Se realizarán análisis de sangre a su hijo antes de que comience a tomar este medicamento y mientras dure el tratamiento para verificar el nivel de estos anticuerpos
- Este medicamento puede aumentar la probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer. Consulte al médico.
- Asegúrese de que su hija se realice revisiones mamarias periódicas. El médico le indicará con qué frecuencia deberá someterse a estas pruebas su hija. Su hija también tendrá que realizarse autoexploraciones mamarias, tal y como le ha indicado el médico. Consulte al médico.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 6 meses después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si su hijo tomó este medicamento durante el embarazo, informe al médico del bebé.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Informe al médico si está amamantando a su hijo.
Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Signos de infecciones por herpes como herpes labial, herpes zóster, llagas en los genitales, dolor de cabeza intenso, confusión, cambio en la visión, enrojecimiento o dolor de los ojos.
- Rigidez del cuello.
- Depresión u otros cambios de humor.
- Nota un bulto en el pecho o el mismo es sensible al tacto.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Se han producido reacciones durante la infusión y dentro de las 24 horas posteriores. En ocasiones, las reacciones a la infusión han puesto en riesgo la vida. Informe al médico de inmediato si su hijo presenta sarpullido, urticaria, escozor, fiebre, arritmia, falta de aliento o dificultad para respirar, mareos o desmayos, malestar estomacal, irritación o dolor de garganta, dolor de cabeza, sensación de cansancio, hinchazón de la garganta, tos, sibilancias o enrojecimiento de la piel durante o 24 horas posteriores a la infusión.
- Ha ocurrido un problema intestinal (colitis) con este medicamento. A veces, esto ha sido grave, lo que ha llevado a un tratamiento en un hospital o a una

intervención quirúrgica. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta diarrea; heces negras, con sangre o de aspecto alquitranado; moco en las heces; o dolor estomacal intenso.

- Este medicamento puede causar un problema cerebral grave llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). Puede provocar discapacidad o puede ser mortal. Informe al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas como confusión, problemas de memoria, depresión, cambios en su comportamiento, cambios en la fuerza de 1 lado del cuerpo que es mayor que la del otro lado, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la vista.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. También se han observado meses después de haber dejado de tomar este medicamento. Informe al médico de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina de color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque

ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Signos de un resfrío común.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor de espalda.
- Diarrea.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.
- Se pueden administrar otros medicamentos para atenuar los efectos secundarios de la infusión.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su

hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios

relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión
2026-05-28

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ocrelizumab - Last updated on May 30, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center